

Klinika Weterynaryjna VETS

Waldemar Wońko

ul. Księżęca 3
00-418 Warszawa
Telefon: 22 622-55-22, 22 622-56-22

WłaścicielZwierzę
2. Atena
Viva 2017 Listopad

ul. Gatunek: pies
Warszawa Rasa: Mieszaniec

Płeć: samica
Data ur.: 20/11/2008
Oznakowanie:

Lekarz prowadzący: lek. wet. Monika Migut

Macica: owczarkowata
Waga: 33 kg

Karta informacyjna wizyty

23/11/2017 22:30: Badanie

Opis badania:

Masa ciała 33 kg; temp. 38,5°C
Spojowki oraz sluzowki jasnorozowe, CRT ok 1s.
Powloki brzuszne nie powiekszone, nie napiete.

W sedacji wykonano zdjęcia RTG klatki piersiowej w 3 projekcjach -w obrazie RTG brak zmian o charakterze neo

W znieczuleniu ogólnym (anestezji wziewnej) wykonano:
-zabieg ovariohysterectomii w linii pośrodkowej.
Założono podwiązki jajników i trzonu macicy: Vicryl 1
Szwyc otrzewnej i mięśni brzucha: vicryl 2
-hemimastectomię po stronie prawej -liczne guzki w obrebie gruczołow L3-L4-L5; w obrebie L4-L5 guz wielksoci

sporego grapefriuta
Założono podwiązki naczyniowe vicryl 1, Vicryl 2-0, Safil 0, szwy zbliżajšce Vicryl 1 oraz Vicryl 2/0, szwy zgłębajšce Vicryl 2-0 oraz Safil 0; szwy wieloczęściowe skóry Nylon 0, miejscami wzmocniona Nylon 0 oraz Dafilon 1
Zmiany (listwe mleczna) wysłano do badania histopatologicznego.

Zalecenia:

Dziękujemy: zwierzęciu zapewniamy spokojne, ciepłe miejsce, bez możliwości wskakiwania czy zeskakiwania z wysokości.

Karmienie: najwcześniej po 12 godzinach od zabiegu tj. rano, porcja znacznie zmniejszona.

Dostęp do wody: zapewniamy dopiero po upływie 6 godzin od zabiegu (małymi porcjami).

Antybiotykoterapia: Enrobioflox do codziennej kontynuacji przez kolejne 7 dni

Przeciwbólowo: miejscowo zastosowano Bupivacainum + Lignocainum, s.c. Biovetalgin; i.v. Poltram

Ochrona rany: ranę operacyjną należy zabezpieczyć przed ingerencją ze strony zwierzęcia oraz przed jej

zamoczeniem czy zabrudzeniem. Zalecamy ubranka ochronne lub/i kołnierz.

Kontrolna wizyta: pozostaje w szpitalu

Szwy: do zdjęcia po upływie 14 dni.

Inne:

* W przypadku obrzęków oraz działających przeciwbólowo sugeruje się 3 razy dziennie stosowanie zimnych okładów

(pod osłoną ręcznika coldpack lub mrożonka warzywna -uwaga aby nie odmrozić skóry około 10-15 min)

* przez cały okres gojenia konieczne ograniczenie ruchu

* Histopatologia: w kwestii wyników proszę kontaktować się z rejestracją nie wcześniej niż po upływie około 10 dni

roboczych od zabiegu.

Zabiegi

POLE CHIRURGICZNE 4

Rękawiczki chirurgiczne 4

RTG <50> 2
Materiały <15>
ZABIEG CHIRURGICZNY TRUDNY 2,5

Zastosowane leki

Cepetor 0,5 ml
Butomidol 10ml 0,5 ml
VENFLON 0.8 (niebieski) 1 szt
PROPOFOL 1% 5AMP20ML 6 ml
Bioketan 10ml, 100mg.ml ketamina 0,5 ml
SOLUTIO RINGERI 500ml 500 ml

podano i.v.

NaCl 500ml 1 butelka

do płukania rany

Poltram 50 2 ml
Cyclonamine 12.5% 2 ml
Lignocainum 20mg/ml, 20 ml 4 ml
Bupivacainum 0.5% 2 ml
Biovetalgin 50% inj 100 ml 3,5 ml
NICI NYLON 3 szt
NICI DAFILON 1 1 szt
NICI Safil 0 2 szt
NICÍ Vicryl 8 szt

Zarejestrował: lek.wet. Piotr Radziszewski

Podpis lekarza weterynarii

