



Maść: czarny podpalany

03-772 Warszawa

Leukocyty	14,3 G/l	(=)	6	16,5	OK	
Limfocyty	1,4 G/l	(=)	0,8	5,1	OK	
Monocyty	0,5 x10^9/l	(=)	0	1,8	OK	
Granulocyty	12,4 G/l	(=)	4	12,6	OK	
Limfocyty %	10 %	(=)	12	30	-	
Monocyty %	3,2 %	(=)				
Grans% (% Granulocytów)	86,8 %	(=)	60	83	+	
Eozynofile	0,5 %	(=)	2	10	-	
Trombocyty	338 G/l	(=)	117	460	OK	

Bad. mikrobiologiczne

Parametr

Biochemia krwi

<u>Parametr</u>	<u>Wartość</u>	<u>J.m.</u>	<u>Min</u>	<u>Max</u>		
Mocznik	19,2 mg/dl	(=)	20	50	-	
Kreatynina	0,62 mg/dl	(=)	0,6	1,8	OK	
Białko całkowite	2,35 g/dl	(=)	5,5	7,5	-	
Albuminy	2,8 g/dL	(=)	3,3	5,6	-	
Globuliny	0,7 g/dL	(=)	0,8	2,3	-	
ALT (GPT) 25°	44 U/L	(=)				
AST (GOT) 25°	32 U/l 25°C	(=)	1	45	OK	
AP (Fosfataza zasadowa)	53 U/l	(=)	20	155	OK	
Glukoza	85 mg/dL	(=)	70	120	OK	

23/11/2017 09:40: Badanie

Opis badania:

Dermatofity

Data zakończenia badania: 23-12-2017

Materiał: Włosy, zeszkrobina

Wynik z preparatu bezpośredniego: UJEMNY

Zabiegi

F DOBA HOTELOWA/SZPITALNA PIES >15 KG

Kwota: 60,00

Zarejestrował: Patrycja Bałdyga-Kacprzak

23/11/2017 21:46: Badanie

Opis badania:

Silny łojotok tłusty całego ciała, umiarkowany świąd.

Pies wychudzony.

Kanały słuchowe - wydzielina łojowa obustronnie w kanałach słuchowych, wyłysienie na grzbietowej i brzusznej części szyi z lichenizacją skóry, wyłysienie między oczami, pachy i pachwiny, lichenizacja i łojotok tłusty, brzuch - łojotok tłusty, w okolicy lędźwiowo krzyżowej łojotok tłusty.

Pobrano: cytologię z ucha, preparaty cytologiczne + cytologię ze zmian skórnych, zeszkrobiny, włos do zbadania - trichogram.

Zeszkrobiny i trichogram - nie uwidoczniiono pasożytów, obraz włosa wskazuje na obecny świąd skóry.

Badanie cytologiczne: badanie uwidoczniło ropne zapalenie skóry tła bakteryjnego - w obrazie widoczne bakterie ziarniaki.

Taki stan może mieć różne przyczyny podstawowe, obecnie wdrażamy antybiotykoterapię.

Konieczne badanie kału met. flotacji.

Zalecenia odnośnie leczenia:

antybiotykoterapia - cefaleksyna 30 mg/kg m.c co 12 + należy podawać probiotyk pomiędzy podaniami antybiotyku

kąpiele lecznicze - Malaseb 2ml/kg m.c 1 raz w tygodniu - sierść moczymy, spieniamy szampon i pozostawiamy pianę na 15 minut, następnie splukujemy pianę
kontrola cytologiczna po 3 tygodniach leczenia
konieczne powtórne podanie Bravecto po 8 tygodniach
kontrolny profil tarczycowy po 3-4 tygodniach leczenia
Diagnoza: ropne zapalenie skóry - ustalanie przyczyny w toku

Zabiegi

CYTOLOGIA

ZESKROBINA-PASOŻYTY SKÓRY

Kwota: 75,00

Zarejestrował: Anna Andrzejewska

24/11/2017 09:02: Badanie

Opis badania:

apetyt zachowany
pragnienie w normie
kał nieco rozluźniony-zbiórka kału
bojaźliwy, ale nie wykazuje agresji
zalecenia-kefivet 2 tabl 2 x dz w osłonie probiotykowej
coatex - 3 kaps/dzień

Zabiegi

F DOBA HOTELOWA/SZPITALNA PIES >15 KG

Zastosowane leki

Kefivet-Vet 500mg (70 tabl.) 4 szt.

Bioprotect 1 szt.

Coatex cena za 1 kaps 60 szt

Kwota: 143,00

Zarejestrował: Anna Szarzyńska- Butkiewicz

Podpis lekarza weterynarii