

**NATOLIŃSKA LECZNICA WETERYNARYJNA S.C.**

ul. Belgradzka 3/UH9  
02-793 Warszawa  
Telefon: 22 - 816 83 33  
E-mail: lecznica.natolin@gmail.com  
*Radiologia Cyfrowa DR*  
*Badania i zabiegi endoskopowe*

**Zwierzę****Blacky Nr: 011800586**

Gatunek: KOT

Rasa: europejski krótkowłosey

Płeć: samiec

Wiek: 2 lata i 4 miesiące

Oznakowanie:

Maść: typowa ;)

**Właściciel Nr: 011300380****Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt  
-Viva !**

Kawęczyńska 16 lok 39

03-772 Warszawa

Telefon: 506357299

Lekarz prowadzący: Lekarz wet. Dr Tomasz Formiński

## Historia wizyt

**18/05/2018 16:32: Badanie****OPIS WYWIADU**

Złamanie kości ramiennej kończyny piersiowej prawej 6 dni temu.

3 dni wcześniej próba stabilizacji zamkniętej za pomocą opatrunku pół usztywniającego (po kilku godzinach opatrunek spadł).

Okolica ramienia ze znacznym obrzękiem.

**OPIS BADANIA**

W znieczuleniu ogólnym wykonano osteosyntezę kości ramiennej prawej (złamanie skośne w 1/3 dalszej kości ramiennej), do stabilizacji wykorzystano płytę kostną drobną o grubości 2 mm, szerokości 5 mm, dziesięć otworów, w prowadzono 9 wkrętów o średnicy 2 mm.

Śródoperacyjnie stwierdzono rozległy krwiak.

Tkanki miękkie zszyto nicią wchłanialną maxon 3-0, skórę zszyto nicią niewchłanialną Dermalon 3-0 (monofilament do usunięcia po upływie 10 dni).

premedykacja: dexdomitor, butomidol, comfortan

indukcja znieczulenia: propofol, midanium z otw

podtrzymanie: znieczulenie w ziewne izofluranowe 1,5% izofluranowe

analgezja przedoperacyjna: tolfina

analgezja śródoperacyjna: fentanyl CRI

analgezja pooperacyjna: bunondol

fentanyl system transdermalny (nie zdejmujemy wcześniej niż po 72h)

Monitoring pacjenta podczas znieczulenia:

HR 85-95/min

RR 10-12/min

SpO2 99%

EtCO2 40-45 mmHg

MAP 80-90 mmHg

Przebieg znieczulenia prawidłowy. Płynotrapia podczas znieczulenia 3 ml/kg/h. Parametry życiowe podczas znieczulenia w zakresie norm.

FENTANYL PLASTER 25 mcg/h

**ZABIEGI****OSTEOSYNTETA M***osteosynteza prawej kości ramiennej***ZASTOSOWANE LEKI**

Inj. Solutio Ringeri 500ML	1	sztuka
Dexdomitor 0,5mg/ml	0,1	ml
COMFORTAN 10 MG/ML 10 ML	0,1	ml
Bioketan 10%	0,1	ml
Propofol-Lipuro 10mg/1ml	1	ml
Synulox inj. /100 ML, inj.	0,5	ml
Sposób podania: Iniekcja podskórna		
Tolfine 100ml	0,6	ml
Sposób podania: Iniekcja podskórna		

## Historia wizyt

Bunondol 0,3MG/ML

1 ml



### ZALECENIA

- zwierzę po zabiegu powinno przebywać w cichym, spokojnym miejscu najlepiej na poziomie podłogi
- pierwszy posiłek wskazany jest dopiero na drugi dzień po zabiegu
- pić może 2h po zabiegu, początkowo woda jedynie na dnie miski
- zwierzę po zabiegu może chwilowo chodzić i w okolicy - jest to spowodowane lekami podawanymi podczas znieczulenia
- proszę o ograniczenie aktywności ruchowej przez najbliższe 6 tygodni
- ochrona rany w postaci kołnierza lub ubranka do zdjęcia szwów (najczęściej jest to 10 dni, decyzja lekarza)
- prosimy o niepodawanie żadnych leków przeciwbólowych bez konsultacji z lekarzem (z wyjątkiem tych wydanych przez lekarza)
- prosimy nie zapominać o koniecznych wizytach kontrolnych zaleconych przez lekarza
- w razie jakichkolwiek pytań lub pojawienia się niepokojących objawów prosimy o pilny kontakt z lecznicą
- proszę o wizyty kontrolne do poniedziałku włącznie



Lekarz: Lek. wet. Dr Agnieszka Panek

---

Podpis lekarza weterynarii