



Animal Center Zofia Gaińska
ul. Zamiany 12
02-786 Warszawa
Telefon: 224141812
E-mail: biuro@animal-center.pl

ANIMAL CENTER

Zwierzę

Chałwa zw z mińska

Gatunek: Kot

Rasa: europejski krótkowłosey

Płeć: samica

Wiek: 6 miesięcy

Oznakowanie:

Maść: bura pręgowana

Właściciel

Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!

Kawęczyńska 16 lok 39

03-772 Warszawa

Telefon: 790817818

Lekarz prowadzący: Zofia Gaińska

Historia wizyt

20/01/2017 20:50: Badanie

Temperatura: 38,7°C

Waga: 1,5 kg

Opis wywiadu: Przyjmuję kotkę do szpitala.

Niewiele informacji- jedynie wypis z wizyty 18.01 (podpięty do karty)

Kotka prawdopodobnie doznała urazu oka z perforacją rogówki- zdecydowano o usunięciu gałki ocznej prawej.

Jednokrotnie odrobaczona (brak informacji o dacie odrobaczenia i użytym preparacie)

Opis badania:

Błony śluzowe jamy ustnej bladoróżowe, wilgotne, crt 1 sek, spojówka w oku lewym bladoróżowa, delikatnie rozpulchniona, węzły chłonne żuchwowe i podkolanowe bez zmian, dokładne badanie osłuchowe niemożliwe, ponieważ kicia mruży, w badaniu otoskopowym mierna ilość brunatnej wydzieliny, brzuch nieznacznie wzdęty, wewnątrz jelit niewielka ilość przelewającej się treści i gazu.

Test bibułowy dodatni.

Okolica rany obrzęknięta, skóra w okolicy pozlepiana brunatnym wysiękiem, z oczodołu wypływa gęsta, brunatna wydzielina. Toaleta rany.

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Fiprex oprysk 3 oprysk

Zalecenia:

- zbiórka kału do badania parazytologicznego

- jutro rano pobranie krwi do badania przesiewowego plus testy FIV/ FeLV

- toaleta rany

- ewentualna konsultacja z chirurgiem, być może trzeba będzie ponownie otworzyć ranę.

Zarejestrował: lek. wet. Anna Misiak

21/01/2017 11:04: -

Zabiegi

Snap Combo Plus (felv/Fiv)

21/01/2017 16:38: Badanie

Opis wywiadu: aktywna, chętnie się przytula
ma apetyt, preferuje mokry pokarm
zabieg enukleacji 18.01, brak informacji o postępowaniu pooperacyjnym/bad krwi
podczas zabiegu convenia

Opis badania:

temp 37,2

bladoróżowa

okolica operowanej gałki ocznej bez podwyższonej ciepłoty, miernie bolesna, po usunięciu strupów, uciśnięciu
widoczny brunatny wysięk w małej ilości
w pozostałym badaniu jak wcześniej

z racji podaży convenii wstrzymuje się podawaniem innego antybiotyku
dzisiaj jedynie toaleta leczenie przeciwzapalne
w poniedziałek konsultacja chirurgiczna dr Sawaszkiwicz?

pobranie krwi

testy FIV/FelV ujemne

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

POBRANIE KRWI

Zastosowane leki

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,15 ML

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml * 5amp. 1 5amp.

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

22/01/2017 14:34: Badanie

Opis wywiadu: bardzo aktywna, dobrze się czuje
duży apetyt
kał w niewielkiej ilości, uformowany - zebrany - lodówka

Opis badania:

toaleta okolic oka, widoczny obrzęk, podwyższona ciepłota, rana pokryta strupem
usunięto strupek, oczyszczono, zdjęto fragment nici, dość duża ilość brunatnej, surowiczej wydzieliny!
powtórzenie leków z wczoraj

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,15 ML

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml * 5amp. 1 5amp.

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

23/01/2017 10:31: Badanie

Temperatura: 38,0°C

Waga: 1,36 kg

Opis wywiadu: samopoczucie dobre, dzisiaj na czczo na wypadek badań dodatkowych

Opis badania:

prawy węzeł chłonny żuchwowy powiększony, ropno-krwisty wysięk z oczodołu prawego, toaleta okolicy oczodołu
prawego, osłuchowo bez nieprawidłowości, brzuch miękki, niebolesny

zdjęto pozostałe szwy, toaleta okolicy oka prawego, przepłukano NaClem, płyn oliwkowa

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zabiegi drobne I

Zastosowane leki

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,15 ML
SOLVERTYL inj. 50mg/2ml * 5amp. 1 5amp.
Metronidazol 250 na tabletki 1 tabl
Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.
Inne materiały 1 szt

Zalecenia:

- Metronidazol 1/20 tabletki 2 razy dziennie
 - Tolfine 1 raz dziennie
 - Solvertyl 1 raz dziennie
 - Bioimmunex 1 raz dziennie
 - toaleta rany wg potrzeb
 - kołnierz ochronny
 - jeśli bez poprawy za parę dni wymaz bakteriologiczny z rany
 - zbiórka kału
- Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

24/01/2017 15:11: Badanie

Opis wywiadu: czuje się dobrze, aktywna
ma duży apetyt

UWAGA - potrafi zdjąć sobie kołnierz

Opis badania:

temp 37,6

różowa, powiększenie prawego ww chł żuchwowego,

oczodół wypełniony w znacznej ilości skrzepem, ropną wydzieliną, powieki pogrubiałe

toaleta okolicy

w pozostałym badaniu bez zmian

4-5x dziennie - płukanie jamy roztworem ringera z mleczanami, niewielka ilość płynu oliwkowa do środka

veteregesic 2-3x dziennie po 0,05ml sc

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,15 ML
SOLVERTYL inj. 50mg/2ml * 5amp. 1 5amp.
Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.
Inne materiały 1 szt
Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

24/01/2017 17:30: -**Zastosowane leki**

Snap IDEXX giardia 1 szt.

Dawkowanie: UJEMNA!!!

TORBUGESIC / 10 ML INJ. 0,05 1 ml

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

24/01/2017 17:30: -**Zabiegi**

25/01/2017 10:35: Badanie

Temperatura: 38,4°C

Opis wywiadu: czuje się dobrze, ma apetyt, aktywna

Opis badania:

śluzówki różowe

w. chłonny podżuchwowy prawy powiększony

w prawego oczodołu- zaczerwieniony brzeg powiekowy z zachniętym strupem, pod strupem wysięk ropno-śluzowy w małej ilości, z oczodołu nieduży wypływ ropno-surowiczy z pojedynczymi skrzepami

płukanie r-rem Ringera, +płyn oliwkowa

osłuchowo bez zmian

brak vetergesicu na stanie, p/bólowo narazie tylko loxicom

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Metronidazol 250 na tabletki 1 tabl

Dawkowanie: 1/20 tabl

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

LOXICOM 5MG 0,1 ml.

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml * 5amp. 0,1 5amp.

Zalecenia:

- kontynuacja metronidazolu 1/20 tabl 2x dziennie

-czekamy na wyniki badania kału

-płukanie oczodołu codziennie r-rwm ringera z mleczanami + płyn oliwkowa na koniec

-p/bólowo vetergesic na bł. sluzowe 2x dziennie

-loxicom zależnie od stanu

Zarejestrował: lek. wet. Magdalena Pokorska-Wójcik

26/01/2017 08:21: Badanie

Temperatura: 38,5°C

Opis wywiadu: Samopoczucie dobre, apetyt w normie. Nie gorączkuje.

Opis badania:

błony śluzowe bladoróżowe, ww chłonny prawy powiększony, osłuchowo bez nieprawidłowości, brzuch miękki, jelita zgazowane

stan oczodołu bez większej poprawy - toaleta Ringerem z mleczanami oraz płynem oliwkowa

podano metronidazol 1/20 tabletki

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zabiegi drobne I

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

TORBUGESIC / 10 ML INJ. 0,05 1 ml

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,15 ML

Zalecenia:

- kontynuacja metronidazolu 1/20 tabl 2x dziennie

-czekamy na wyniki badania kału

-płukanie oczodołu codziennie r-rwm ringera z mleczanami + płyn oliwkowa na koniec - 4-5 razy dziennie

-p/bólowo vetergesic na bł. sluzowe 2x dziennie

-loxicom/tolfine zależnie od stanu

- dzisiaj Torbugesic p-bólowo zamiast Vetergesicu

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

27/01/2017 09:14: Badanie

Temperatura: 37,8°C

Opis wywiadu: ma apetyt, aktywna
kicha

bez gorączki

w bad. kału TOXOCAROZA

Opis badania:

śluzówki różowe

gardło lekko przekrwione, ww.chłonne podżuchwowe powiększone

surowiczy mierny wyciek z nosa i lewego oka, spojówka rozpulchniona

prawe oko lepiej, ropno-śluzowy wypływ w małej ilości, mniejsza szpara, pod strupem na brzegach rany miejscami
jeszcze trochę wysięku

płukanie oczodołu z ringerem z mleczanami i oliwkowa

metronidazol 1/20 tabl p.o

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,2 ML

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zalecenia:

- jeśli do poniedziałku będzie utrzymywał się ropno-sluz wypływ z rany to wymaz na posiew w pon

-jesli lepiej to decyzja o powtórej convenii w środę 1.01

-metronidazol nadal 1/20 tabl 2x dziennie

-bioimmunex felis 1 kaps 1 xdz

-tolfine p/zapalnie jeszcze do końca tygodnia

-lizyna w żelu- 2x dziennie po 1 ml p.o

-codzienna toaleta rany z ringerem z mlec + oliwkowa

-aniprazol przez 3 dni 1/5 tabl

Zarejestrował: lek. wet. Magdalena Pokorska-Wójcik

28/01/2017 10:20: Badanie

Temperatura: 38,3°C

Opis wywiadu: samopoczucie dobre, nie zjadła całego śniadania

nie gorączkuje

Opis badania:

nieznacznie zaczerwienione brzożki oczodołu, niewielka ilość ropnego wysięgu w okolicy rany- toaleta płynem Ringera i płynem Oliwkowa

powiększone węzły chłonne żuchwowe, zaczerwieniona błona śluzowa gardła, błony śluzowe jamy ustnej różowe, spojówka oka lewego różowa

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zalecenia:

- w poniedziałek prawdopodobnie pobranie wymazu z oczodołu
 - jeżeli będzie lepiej to powtórka konwencji 1.02
 - bioimmunex felis 1 kaps 1 raz dziennie
 - lizyna w żelu 2 razy dziennie p.o. po 1 ml
 - codzienna toaleta rany płynem Ringera z mleczanami + płyn Oliwkowa
 - jutro ostatnia dawka aniprazolu
- Zarejestrował: lek. wet. Anna Misiak

29/01/2017 13:25: Badanie

Temperatura: 37,9°C

Opis wywiadu: Zaczęła kichać, wypływ surowiczy z nosa i lewego oka. Nie gorączkuje.

Nie dojadła wczorajszego posiłku, dziś dostała mokre i zjadła, choć bez wielkiego apetytu.

Dokonano toalety rany, podano bioimmunex, metronidazol, aniprazol i torbugesic. Zrobiono też inhalację.

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 0,5 szt

TORBUGESIC / 10 ML INJ. 0,05 1 ml

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zarejestrował: mgr Monika Niewolewska

30/01/2017 13:29: Badanie

Temperatura: 38,6°C

Waga: 1,46 kg

Opis wywiadu: czuje się ok, apetyt w normie

Opis badania:

błony śluzowe różowe, prawy węzeł chłonny powiększony, osłuchowo bez rżenia, brzuch miękki, niebolesny

podano metronidazol

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zabiegi drobne I

Zastosowane leki

Inne materiały 0,5 szt

TORBUGESIC / 10 ML INJ. 0,05 1 ml
Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zalecenia:

- Metronidazol bez zmian na razie - za 2 tygodnie prawdopodobnie odstawienie, jeśli wszystko będzie dobrze
 - Tolfine co drugi dzień
 - na razie odstawiam Torbugesic/vetergesic
 - w środę powtórka Convenii
 - bioimmunex felis 1 kaps 1 raz dziennie
 - lizyna w żelu 2 razy dziennie p.o. po 1 ml
 - codzienna toaleta rany płynem Ringera z mleczanami + płyn Oliwkowa
 - 10 lutego -13 lutego Aniprazol - za 2 tygodnie kolejna seria, za 4 tyg kontrolne bad kału (flotacja)
- Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

31/01/2017 14:27: Badanie

Opis wywiadu: kicha
samopoczucie dobra, ma apetyt

Opis badania:

temp 38

powiększony prawy ww chł żuchwowy

rana po zabiegu enukleacji goi się prawidłowo, brak wysięku, wypłukano ringerem z mleczanami plus płynem oliwkowa

osłuchowo bez zmian

brzuch miękki, niebolesny

na razie bez zmiany antybiotyku

ze względu na bolesność tkanek oczodołu, prawdopodobnie rozpoczynający się st zapalny górnych dróg oddechowych - dzisiaj tolfine przeciwzapalnie

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zabiegi drobne I

Zastosowane leki

Inne materiały 0,5 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,2 ML

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

01/02/2017 08:38: Badanie

Temperatura: 37,8°C

Opis wywiadu: samopoczucie lepsze, kicha nadal ma apetyt, ale dziś nie dojadła do końca

Opis badania:

śluzówki różowe

w jamie ustnej bez nadżerek, zaczerwienione gardło

surowiczy wpływ z nosa

z prawego oczodołu mała ilość wysięku- płukanie ringerem z mlec + oliwkowa

osłuchowo nieznaczne rzężenia z gdo

powtórka convenii

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Metronidazol 250 na tabletki 1 tabl

Convenia / inj 10 ml 0,15 ml

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zalecenia:

- metronidazol 1/20 tabl 2x dziennie do końca tygodnia, potem decyzja o kontynuacji

- tolfine co drugi dzień do końca tygodnia

- bioimmunex felis 1 kaps 1x dziennie

- lizyna 1 ml p.o 2x dziennie

- codzienna toaleta rany

- aniprazol-powtórka za 2 tygodnie 13/14/15.02

Zarejestrował: lek. wet. Magdalena Pokorska-Wójcik

01/02/2017 21:01: Badanie

Opis badania:

Podano 30 j.m. interferonu s.c.

Zarejestrował: lek. wet. Maria Kłucjasz

02/02/2017 08:15: -

Temperatura: 38,5°C

Waga: 1,4 kg

Zarejestrował: lek. wet. Agnieszka Zielonka

02/02/2017 09:12: Badanie

Temperatura: 38,6°C

Opis wywiadu: Samopoczucie bardzo dobre, apetyt w normie, rana goi się ładnie.

Opis badania:

błony śluzowe różowe, węzeł chłonny żuchwowy prawy powiększony, lewy w normie, w jamie ustnej bez nadżerek, wypłukano wnętrze oczodołu prawego ciepłym naćlem, wypłukano nieco skrzepu, brzegi rany potraktowano oliwkowem, osłuchowo lekkie szmery nad GDO, nad płucami czysto, kanały słuchowe zewnętrzne z minimalną ilością wydzieliny

Podano metronidazol.

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zabiegi drobne I

Zastosowane leki

Inne materiały 0,5 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

SOL 100ml NaCl 1 szt.

Płyn Oliwkowa 1 ml

Zalecenia:

- metronidazol 1/20 tabl 2x dziennie do końca tygodnia, potem decyzja o kontynuacji

- tolfine co drugi dzień do końca tygodnia

- bioimmunex felis 1 kaps 1x dziennie
- lizyna 1 ml p.o 2x dziennie
- codzienna toaleta rany
- aniprazol-powtórka za 2 tygodnie 13/14/15.02

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

02/02/2017 12:19: Badanie

Opis wywiadu: podano 30j interferonu sc

Zalecenia:

Interferon w schemacie:

- 3 dni po 30j na kota
- po 2óch tygodniach II seria
- po 2mcach 30j przez 3 kolejne dni

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

03/02/2017 14:31: Badanie

Opis wywiadu: czuje się dobrze, ma apetyt

Opis badania:

śluzowki różowe
bez cech odwodnienia
mniejszy wypływ z lewego oka i nozdrzy

prawy oczodół goi się prawidłowo- toaleta

brzuch miękki, niebolesny
osłuchowo niewielkie rzężenia z gdo

podano metronidazol i lizynę p.o
dziś 3 dawka interferonu

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt
Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.
TOLFINE / 100 ML INJ. 0,15 ML

Zalecenia:

- metronidazol 1/20 tabl 2x dziennie do końca tygodnia, potem decyzja o kontynuacji
- tolfine co drugi dzień do końca tygodnia
- bioimmunex felis 1 kaps 1x dziennie
- lizyna 1 ml p.o 2x dziennie
- codzienna toaleta rany
- aniprazol-powtórka za 2 tygodnie 13/14/15.02

-od 15.02- druga seria interferonu przez 3 dni
Zarejestrował: lek. wet. Magdalena Pokorska-Wójcik

04/02/2017 10:52: Badanie

Temperatura: 38,1°C

Opis wywiadu: Samopoczucie dobre, nie chciała zjeść saszetki gastro. Zjadła z chęcią aplawsa kurczakowego. Rana zarasta. Nie kicha.

Opis badania:

śluzówki różowe, wv chłonne niepowiększone zuchwowe, osłuchiwanie utrudnione przez mruczenie, brzuch miękki, niebolesny

toaleta rany

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,15 ML

Zalecenia:

- metronidazol 1/20 tabl 2x dziennie do końca tygodnia, potem decyzja o kontynuacji

- tolfine co drugi dzień do końca tygodnia

- bioimmunex felis 1 kaps 1x dziennie

- lizyna 1 ml p.o 2x dziennie

- codzienna toaleta rany

- aniprazol-powtórka za 2 tygodnie 13/14/15.02

- od 15.02- druga seria interferonu przez 3 dni

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

05/02/2017 15:47: Badanie

Opis badania:

Ma apetyt ale apatyczna.

Bez wpływu z rany.

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zarejestrował: lek. wet. Maria Kłucjasz

06/02/2017 09:36: Badanie

Temperatura: 38,0°C

Waga: 1,48 kg

Opis wywiadu: Chętnie zjadła.

Dzisiaj dużo kicha, jest troszkę bardziej osowiała

Zdjęła sobie kołnierz

Opis badania:

nie gorączkuje

błony śluzowe jamy ustnej różowe, wilgotne, spojówka oka lewego zaczerwieniona, rozpulchniona, niewielka ilość surowiczego wysięku, niewielka ilość ropnego wysięku w oku prawym, na brzegach rany, węzły chłonne dostępne do badania prawidłowe, brzuch miękki, niebolesny, niewielka ilość płynnej treści wewnątrz jelit, osłuchowo bz

toaleta prawego oczodołu- rr NaCl + płyn Oliwkowa

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zalecenia:

- metronidazol 1/20 tabletki 2 razy dziennie

- stymulacja układu odpornościowego bez zmian- Bioimmunex + lizyna

- codziennie toaleta rany

- 13/14/15. 02.- kolejna seria aniprazolu

- od 15.02 kolejna seria interferonu

Zarejestrował: lek. wet. Anna Misiak

07/02/2017 14:46: Badanie

Opis wywiadu: samopoczucie dobre
chętnie zjadła

Opis badania:

temp 37,6

okolica rany pokryta zaschniętym wysiękiem, jak ropnym, raczej pogorszenie

toaleta rany nacl + płyn oliwkowa

w pozostałym bad jak wczoraj

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zalecenia:

zalecenia bez zmian

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

08/02/2017 12:01: Badanie

Temperatura: 38,0°C

Opis wywiadu: czuje się dobrze, aktywna
nie kicha

kał rozwolniony

Opis badania:

śluzówki różowe

spojówki lekko rozpulchnione

gardło zaczerwienione

z prawego oka mała ilość wysięku, podropiałego- toaleta z pł. oliwkowa

podano metronidazol p.o

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt
Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zalecenia:

- bioimmunex i lizyna bez zmian
 - następna seria interferonu od 15.02
 - codziennie toaleta rany z pł. oliwkowa
 - do pt kontynuacja metronidazolu 1/10 tabl 2x dz
 - canigest 1x dz po 2 ml do soboty włącznie (min 2h odstępu od innych leków doustnych)
 - w przyszłym tygodniu zależnie od stanu rany decyzja o kolejnej iniekcji convenii -14/02
- Zarejestrował: lek. wet. Magdalena Pokorska-Wójcik

09/02/2017 10:55: Badanie

Temperatura: 38,6°C

Opis wywiadu: Czuje się dobrze, apetyt w normie, nie kicha.

Opis badania:

błony śluzowe różowe, ww chłonne zuchwowe niepowiększone, rozpulchniona spojówka w oku lewym, brzuch miękki, niebolesny, uszy wyczyszczono

okolica oczodołu prawego pokryta wysiękiem/strupem - wskazana interwencja chirurgiczna i odświeżenie brzegów rany

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt
Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.
Metronidazol 250 na tabletki 1 tabl
Floaxal krople do oczu 0,3% 5 ml 1 szt.
SOL 100ml NaCl 1 szt.

Zalecenia:

- bioimmunex i lizyna bez zmian
- następna seria interferonu od 15.02
- do pt kontynuacja metronidazolu 1/10 tabl 2x dz
- canigest 1x dz po 2 ml do soboty włącznie (min 2h odstępu od innych leków doustnych)
- do oka lewego Difadol 2 razy dziennie

Zalecenia okulistyczne od dr Łobaczewskiej:

- Floxal lub gentamycyna w kroplach do oczodołu 3 razy dziennie
- płukanie roztworem NaClu
- jutro kontrolna morfologia na czczo
- konieczna interwencja chirurgiczna - wtorek dr Wilkowska

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

10/02/2017 10:58: Badanie - kontynuacja

Kontynuacja leczenia

Opis wywiadu: czuje się dobrze, ma apetyt, aktywna

Opis badania:

śluzówki różowe
spojówki lekko rozpulchnione
brzuch miękki, niebolesny

w oczodole bez wysięku, zarastają brzegi futrem- płukanie nacl +flokstal

kotka nie na czczo- pobranie krwi na morfologię jutro

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt
Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.
Metronidazol 250 na tabletki 1 tabl
SOL 100ml NaCl 1 szt.
Floxxal krople do oczu 0,3% 5 ml 1 szt.

Zalecenia:

-już bez metronidazolu

- bioimmunex i lizyna bez zmian
- następna seria interferonu od 15.02
- canigest 1x dz po 2 ml do soboty włącznie (min 2h odstępu od innych leków doustnych)
- do oka lewego Difadol 2 razy dziennie

Zalecenia okulistyczne od dr Łobaczewskiej:

- Floxxal lub gentamycyna w kroplach do oczodołu 3 razy dziennie
- płukanie roztworem NaClu
- jutro kontrolna morfologia na czczo
- konieczna interwencja chirurgiczna - wtorek dr Wilkowska
Zarejestrował: lek. wet. Magdalena Pokorska-Wójcik

11/02/2017 09:53: Badanie

Opis wywiadu: Czuje się dobrze

Apetyt dopisuje.

Oddała kał prawidłowo uformowany.

Opis badania:

błony śluzowe różowe, wilgotne
 spojówka oka lewego różowa, rozpulchniona, w kąciaku oka zbiera się mlecznobiały wypływ
 w prawym oczodole niewielka ilość ropnego wysięku, brzegi rany porastają futerkiem- toaletą rany
 w okolicy nozdrzy niewielka ilość surowiczego wypływu
 węzły chłonne powierzchowne bz
 osłuchowo bez nieprawidłowości
 brzuch miękki, niebolesny

podano krople do oczu wg zaleceń okulisty

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt
Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zalecenia:

- bioimmunex i lizyna bez zmian
- następna seria interferonu od 15.02
- canigest 1x dz po 2 ml do soboty włącznie (min 2h odstępu od innych leków doustnych)
- do oka lewego Difadol 2 razy dziennie

Zalecenia okulistyczne od dr Łobaczewskiej:

- Floxal lub gentamycyna w kroplach do oczodołu 3 razy dziennie
 - płukanie roztworem NaClu
 - poniedziałek badanie krwi profil przesiewowy
 - konieczna interwencja chirurgiczna - wtorek dr Wilkowska
- Zarejestrował: lek. wet. Anna Misiak

12/02/2017 16:25: Badanie

Opis wywiadu: Czuje się dobrze, ma apetyt

niewielka ilość ropnej wydzieliny w okolicach oczodołu

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zarejestrował: lek. wet. Anna Misiak

13/02/2017 10:12: Badanie

Temperatura: 38,3°C

Waga: 1,53 kg

Opis wywiadu: czuje się bardzo dobrze, ma apetyt, kał i mocz oddała prawidłowo

troszkę przybrała na wadze

Opis badania:

błony śluzowe jamy ustnej bladnoróżowe, wilgotne, spojówka oka lewego rozpalniona, zaczerwieniona, w kąciku zbiera się biały wypływ, w prawym oczodole niewielka ilość ropnego zaschniętego wysięku, węzły chłonne dostępne do badania prawidłowe, brzuch miękki niebolesny, osłuchowo bez nieprawidłowości

toaleta oczodołu roztworem NaCl + płynem Oliwkowa

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zalecenia:

- bioimmunex i lizyna bez zmian
- kolejna seria interferonu od 15.02
- do oka lewego Difadol
- do oczodołu Floxal lub gentamycyna

- dzisiaj pobranie krwi na profil przesiewowy

- jeżeli wyniki będą ok jutro interwencja chirurgiczna u dr Wilkowskiej
Zarejestrował: lek. wet. Anna Misiak

14/02/2017 12:48: Badanie

Opis badania:

Reoperacja zamknięcia nie zagojonej szpary powiekowej po patroszeniu oczodołu; W oczodole nieznaczne cechy martwicy w przyśrodkowym kacie oczodołu - tkanki odświeżono poprzez łyżeczkowanie łyżeczką kostną - oczodół intensywnie przepłukano; Odświeżono brzegi rany i ranę zszyto ponownie;

zalecenia :

1. Dziś wieczorem mała kolacja, kot może pić wodę jeśli zechce;
2. Ochrona rany przed drapaniem - mały kołnierz - 7,5 cm;
3. P/bólowo ;
 - metacam na 2-3 dni;
 - Buprenorfina 0,1 ml 24-36 h po zabiegu; Może być p.o. lub i.m.
4. Zdjęcie szwów skórnych za 10 dni;

Zabiegi

Inne materiały oper

O inna 300

Zastosowane leki

Dexdomitor 0,02 ml

Bioketan inj. 10ml 0,1 ml

TORBUGESIC / 10 ML INJ. 0,05 1 ml

Midanium inj. 5mg/1ml 0,5 amp

VETERGESIC VET 0,3 MG/ML ROZTW DO WSTRZ. 0,1 ml

Sol 250 ml Ringer 1 szt.

do płukania

SOL 100ml NaCl 1 szt.

WENFLON NIEBIESKI 1 szt.

WLEWNIK 1 szt.

Ostrze skalpel 2 szt

RĘKAWICE STERYLNE 6.5 / ANSEL 1 PARA

Pole chir. 50x50 1 szt.

Pole chir 75x75 1 szt.

Nić Amifil 5-0 1 szt.

Zarejestrował: lek. wet. Małgorzata Wilkowska

14/02/2017 14:20: Badanie

Opis badania:

Podano krople.

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zarejestrował: lek. wet. Maria Kłucjasz

15/02/2017 08:39: Badanie

Temperatura: 37,8°C

Opis wywiadu: czuje się dobrze, aktywna, ma apetyt

Opis badania:

śluzówki różowe, bez cech odwodnienia

spojówka w lewym oku jeszcze rozpułchniona

w jamie ustnej bez nadżerek

brzuch miękki, niebolesny
co jakiś czas kicha

szew suchy, bez wysięku, lekki obrzęk wokół szwów, ciut więcej w dolnych partiach

p/bólowo tolfine, czuje się dobrze, więc bez wlewu, zdjęcie wenflonu
powtarzam jeszcze dziś convenię
od dziś 2 seria interferonu

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt
Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.
TOLFINE / 100 ML INJ. 0,16 ML
Convenia / inj 10 ml 0,2 ml

Zalecenia:

- p/bólowo tolfine/metacam jeszcze 2 dni
- zależnie od stanu buprenorfina 0,1 ml p.o/i.m
- lizyna, bioimmunex bez zmian
- zdjęcie szwów 23.02
- jutro i pojutrze kolejne dawki interferonu

Zarejestrował: lek. wet. Magdalena Pokorska-Wójcik

16/02/2017 09:25: Badanie

Temperatura: 39,4°C

Opis wywiadu: Chałwa zjadła bardzo chętnie. Wczoraj nie kichała, dzisiaj kichała seriami.

Opis badania:

błony śluzowe różowe, ww chłonne zuchwowe miernie powiększone, spojówka lekko rozpulchniona - zapuszczono krople, rana pooperacyjna na głowie wygląda dobrze, nic się nie sączy, osłuchowo wmożenie nad GDO, nad płucami bez nieprawidłowości, nad sercem również, brzuch miękki, niebolesny, kanały słuchowe czyste

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt
Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.
SOLVERTYL inj. 50mg/2ml * 5amp. 1 5amp.
METACAM 5 MG/ML INJ 100 ML 0,1 ML

Zalecenia:

- działanie Convenii kończy się 1 marca
- jutro i pojutrze kolejna dawka interferonu (srowadzamy)
- dzisiaj Metacam p-bólowo i przeciwgorączkowo
- Solvertyl osłonowo przy Metacemie
- zależnie od stanu buprenorfina 0,1 ml p.o/i.m
- lizyna, bioimmunex bez zmian
- zdjęcie szwów 23.02

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

17/02/2017 08:44: Badanie - kontynuacja

Kontynuacja leczenia

Temperatura: 38,1°C

Opis wywiadu: dziś lepiej, bardziej aktywna
bez gorączki

zjadła

co jakiś czas kicha

Opis badania:

śluzówki różowe

wł. chłonne podżuchwowe nieznacznie powiększone

gardło przekrwione, na języku bez nadżerek

bez wypływu z nosa i worków spojówkowych

osłuchowo nieznaczne zaostrenie nad gdo

brzuch miękki, niebolesny

szew suchy, bez wysięku, minimalny obrzęk, mniejszy niż w środę

podano kropelki do oka- difadol

ogólnie metacam s.c

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml * 5amp. 1 5amp.

METACAM 5 MG/ML INJ 100 ML 0,1 ML

Zalecenia:

- działanie Convenii kończy się 1 marca

- dziś i jutro kolejna dawka interferonu (jak dotrze do nas)

- Solvertyl osłonowo przy Metacemie

-zależnie od stanu buprenorfina 0,1 ml p.o/i.m

-lizyna, bioimmunex bez zmian

-zdjęcie szwów 23.02

Zarejestrował: lek. wet. Magdalena Pokorska-Wójcik

18/02/2017 13:26: Badanie

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Zalecenia:

podano interferon 30 j sc

- jutro kolejne podanie

- po 2mcach 30j przez 3 kolejne dni

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

18/02/2017 15:37: Badanie

Opis badania:

Mruczy przy osłuchiwaniu. lekko powiększone węzły chłonne żuchwowe, nastrzykane naczynia krwionośne podniebienia. temp. 38,1

Podano Difadol

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml * 5amp. 0,25 5amp.

METACAM 5 MG/ML INJ 100 ML 0,1 ML

Zarejestrował: lek.wet. Aleksandra Klimczuk

19/02/2017 13:01: Badanie

Opis badania:

Podano difadol do oka, lizynę

Podano interferon 30 j. ins. s.c.

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml * 5amp. 0,25 5amp.

METACAM 5 MG/ML INJ 100 ML 0,1 ML

Zarejestrował: lek.wet. Aleksandra Klimczuk

20/02/2017 09:42: Badanie

Temperatura: 38,3°C

Waga: 1,7 kg

Opis wywiadu: Samopoczucie bardzo dobre, aktywna.

Jak zawsze bardzo chętnie zjadła śniadanie. Kał w kuwecie prawidłowo uformowany.

Przybrała na wadze.

Opis badania:

Nie gorączkuje.

Błony śluzowe jamy ustnej różowe, wilgotne, czas kapilarny w normie, bez nadżerek w jamie ustnej, okolica nozdrzy sucha, bez wypływu, w oku lewym spojówka nadal nieznacznie rozpulchniona i zaczerwieniona, minimalna ilość zaschniętego wypływu w kąci oka, rana po zaszcyciu lewego oczodołu wygląda dobrze, nie ma obrzęku, niewielka ilość zaschniętego wysięku w okolicy założonych szwów, węzły chłonne żuchwowe nieznacznie powiększone (prawy trochę większy), w badaniu otoskopowym niewielka ilość ciemnej wydzieliny, osłuchowo brak nieprawidłowości, brzuch miękki, niebolesny

Nie podaje metacamu, dostawała go przez 4 dni

Czyszczenie uszu preparatem Epi otic

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zalecenia:

- 23 lutego (czwartek) zdjęcie szwów

- nadal stymulacja odporności (Bioimmunex + lizyna)

- Difadol do oka lewego 2 razy dziennie

- działanie konwencji kończy się 1 marca

Zarejestrował: lek. wet. Anna Misiak

Podpis lekarza weterynarii