



Klinika Weterynaryjna VETS
ul. Książęca 3
00-418 Warszawa
Telefon: 22 622-55-22, 22 622-56-22

Właściciel

DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Lekarz prowadzący:

Zwierzę

Cleo

Gatunek: pies

Rasa: Jack Russell Terrier

Płeć: samica

Wiek: 6 lat i 8 miesięcy

Oznakowanie:

Maść: typowa

Karta informacyjna wizyty

06/06/2019 20:05: BADANIE



OPIS WYWIADU

Wypadek komunikacyjny - złamanie miednicy.

Złamanie skośne ze skróceniem kości biodrowej z ujęciem grzbietowej części kości kulszowej powyżej panewki, ze złamaniem i przemieszczeniem dogłowo - dośrodkowym około 1,2cm trzonu kości kulszowej prawej oraz złamanie poprzeczne kości biodrowej lewej.

Podczas badania temp. w kale skrzepy krwi.



OPIS BADANIA

Pod opieką anestezjologa

- założono cewnik foley-a - produkcja moczu prawidłowa.

- wykonano repozycję złamania trzonu kości biodrowej lewej. Stabilizację uzyskano poprzez płytkę rekonstrukcyjną prostą oraz wkręty 2,0

Założono szwy mięśni i powięzi mięśnie PDX 4-0, szwy zagłębione PDX 4-0 oraz szew śródskórny Dafilon 3-0.

- wykonano repozycję złamania trzonu kości biodrowej prawej. Stabilizację uzyskano poprzez hemi cerkłaż oraz cerkłaż - fi 1,6.

Założono szwy mięśni i powięzi mięśnie PDX 4-0, szwy zagłębione PDX 4-0 oraz szew śródskórny Dafilon 3-0.

- wykonano kontrolne zdjęcie rtg



ZABIEGI

ZABIEG CHIRURGICZNY TRUDNY

CEWNIKOWANIE PSA

RTG <50>

Materiały <15>



ZASTOSOWANE LEKI

CEWNIK pies 1 szt

SERWETA CHIR.NIEBIESKA STERYLNA 75 X 75 1 SZT.

SERWETA CHIRURGICZNA 75x95 2 szt

SERWETA CHIR. STERYLNA 50 X 50 1 SZT.

REKAWICZKI CHIRURGICZNE 6 szt.

NICI PDX 4/0 2 szt.

NICI DAFILON 3/0 1 sztuka

NaCl 100ml 1 szt.

Dawkowanie: do zwilżania i płukania ran

Płytką drobną samodociskową 5,0 x 1,5 mm dla wkrętów fi2,0mm 4 otwory L 27 mm 1 szt

Wkręt do kości drobnych 2,0/1,3 mm L 17 mm heksagonalny samogwintujący 6 szt



ZALECENIA

SZPITAL : przez najbliższe minimum 3-7 dób sugeruję pozostawienie pacjentki pod opieką szpitalną

OGRANICZAMY RUCH do minimum (bez możliwości wskakiwania czy zeskakiwania z wysokości w przeciwnym razie dojść może do destabilizacji)

Oferujemy miękkie posłanie, podłogę najlepiej z wykładziną , nie śliską, ograniczony teren do przemieszczania się (kojec).

OCHRONA RANY : konieczna ochrona przed ingerencją ze strony zwierzęcia, przed uszkodzeniem, wylizaniem, zabrudzeniem, czy zamoczeniem rany. Sugeruje się kołnierz ochronny

ANTYBIOTYKOTERAPIA: Linco-spectin przez kolejnych minimum 10 dni (ew Aniclindan w sut komplikacji w gojeniu dawka 11mg/kg jeśli prawidłowy przebieg gojenia 5,5mg/kg)

RTG: - kontrolne za około 4-ry tydzień lub ew wcześniej jeśli jakiegokolwiek wątpliwości (najlepiej na wizytę umówić się na konkretny dzień i godzinę i w dniu wizyty nie karmić psa - ze względu na ew. sedację tj znieczulenie)

ZDJĘCIE SZWÓW: za około 12 dni

INNE:

* ze względu na znaczne uszkodzenie okolicznych tkanek możliwe trudności w gojeniu

* ew. w przypadku możliwości współpracy 3 razy dziennie po 10-15 minut staramy się przez 3 dni chłodzić okolicę rany (działając w ten sposób p-obrzękowo i p- bólowo)

* koniecznie przez najbliższe doby do jedzenia dodajemy Olej parafinowy ew wykonujemy lewatywę



Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Podpis lekarza weterynarii