



**ANIMAL
CENTER**

Animal Center Zofia Gaińska

ul. Zamiany 12

02-786 Warszawa

Telefon: 224141812

E-mail: biuro@animal-center.pl

Zwierzę

Czarnuszka / Melania

Gatunek: Kot

Rasa: europejski krótkowłosy

Płeć: samica

Wiek: 4 lata i 1 miesiąc

Oznakowanie:

Maść: tricolor

Właściciel

Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!

Kawęczyńska 16 lok 39

03-772 Warszawa

Telefon: 790817818

Lekarz prowadzący: Zofia Gaińska

Historia wizyt

30/12/2016 15:10: Badanie

Waga: 2,6 kg

Opis wywiadu: Przyjmuje kotkę do szpitala.

Kotka po wypadku komunikacyjnym. Nie ma wypisu z poprzedniej lecznicy. Wiadomo jedynie, że wczoraj dostała metacam, rapidexon i betamox. Lekarz stwierdził niedowład kończyn miednicznych. U nas zostaje na diagnostykę i leczenie.

Opis badania:

Błony śluzowe jamy ustnej bladoróżowe, crt poniżej 2 sek, spojówki różowe, węzły chłonne dostępne do badania prawidłowe, dokładne osłuchanie kotki niemożliwe, ponieważ wokalizuje, powiększony obrys jamy brzusznej, brzuch spięty, bolesny, pęcherz moczowy bardzo wypełniony, w prostrnicy wyczuwalne zbite masy kałowe.

Pobrałam mocz i krew do badania.

Mocz oddaje bezwiednie.

Test bibułowy dodatni.

Zabiegi

POBRANIE KRWI

Snap Combo Plus (felv/Fiv)

ujemne!!!

RTG

Rtg kolejne

Pobyt doba bezdomne

Pobranie moczu

Zastosowane leki

Fiprex oprysk 3 oprysk

Zalecenia:

- konsultacja neurologiczna (3.01. godzina 16.00 lek.wet. Jacek Sobczyński)

- wskazane badanie USG jamy brzusznej + zdjęcie RTG kręgosłupa

- zbiórka kału do badania (dzisiaj pierwsza próbka zebrana)

- dalsze zalecenia po wynikach badań dodatkowych)

Zarejestrował: lek. wet. Anna Misiak

30/12/2016 19:09: -

Zabiegi

VETLAB -PROF.PRZESIEWOWY

Mocz + kreatynina

Zarejestrował: AA Laboratorium

30/12/2016 21:05: Badanie

Opis wywiadu: Niewiadomo, kiedy uraz, niewiadomo, czy jest w stanie samodzielnie oddać mocz.

Nie chce jeść odkąd jest u nas.

Opis badania:

świadomość zachowana, utrzymuje postawę stojącą, nieźborność kk miednicznych w chodzie, odruch grożenia osłabiony obustronnie, czucie twarzy, o.powiekowy obustronnie w normie, odruch źreniczny pośredni i bezpośredni obustronnie w normie, oczopląs fizjologiczny zachowany

brak korektury kk miednicznych, piersiowych w normie,

odruchy nn rdzeniowych kk piersiowych w normie, odruchy kk miednicznych - kulzowy osłabiony, rzepkowy wzmożony (pseudohyperreflexia?), zginania osłabiony w obu kończynach, czucie głębokie zachowane

brak odruchu z mm skórnoego w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa

odruch odbytowy osłabiony?

pęcherz moczowy spory w momencie badania - daje się z oporem wycisnąć

na zdjęciu RTG widoczne zaleganie kału na terenie j.grubego i widoczny uraz kostny we fragmencie L7-S1 kręgosłupa

Zastosowane leki

TORBUGESIC / 10 ML INJ. 0,1 1 ml

OLEJ PARAFINOWY / 1 L 1 ML

Lactulosum na ml 1 szt.

Zalecenia:

- Torbugesic 0,1 ml 3 razy dziennie
- Olej parafinowy + laktuloza 1:1 jutro rano
- czekamy na wyniki badań krwi i wtedy dalsze zalecenia
- czekamy na więcej info od Pani Ostrowskiej
- konsultacja neurologiczna (3.01. godzina 16.00 lek.wet. Jacek Sobczyński)
- wskazane badanie USG jamy brzusznej + zdjęcia RTG - poniedziałek dr Czubaj i dr Misiak
- zbiórka kału do badania (dzisiaj pierwsza próbka zebrana)

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

31/12/2016 16:20: Badanie

Temperatura: 38,4°C

Opis wywiadu: Nie zjadła kolacji. Po kroplówce chętnie zjadła.

Nie oddała kału, nie oddaje sama moczu.

Opis badania:

w badaniu klinicznych podobnie, jak wczoraj

czucie głębokie zachowane w kk miednicznych, czucie ogona osłabione

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Założenie wenflonu

Zastosowane leki

Sol 250 ml NaCl:GLUKOZA 1:1 1 szt.

Dawkowanie: 100 i.v

Duphylate 20 ml

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml * 5amp. 1 5amp.

CERENIA inj 0,25 ML

TORBUGESIC / 10 ML INJ. 0,2 1 ml

Dawkowanie: po 0,1

OLEJ PARAFINOWY / 1 L 2 ML

Lactulosum na ml 2 szt.

SYNERGAL INIEKCJA / 50ML 0,15 ML

Zalecenia:

- Torbugesic 0,1 ml 2- 3 razy dziennie

- Olej parafinowy + laktuloza 1:1 2 razy dziennie - jeśli nie odda kału lewatywa

- konsultacja neurologiczna i ortopedyczna 3.01. godzina 16.00 lek.wet. Jacek Sobczyński i dr Lipiński

- wskazane badanie USG jamy brzusznej + zdjęcia RTG - poniedziałek dr Czubaj i dr Misiak

- zbiórka kału do badania (dzisiaj pierwsza próbka zebrana)

- pęcherz - wyciskamy manualnie 3 razy dziennie

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

01/01/2017 12:14: Badanie - kontynuacja

Kontynuacja leczenia

Opis wywiadu: czuje się dobrze, stara się poruszać na kończynach miednicznych

po nocy bez kału, mokry ręcznik

zjadła chętnie śniadanie, pije wodę

Opis badania:

klinicznie jak w poprzednich badaniach

pęcherz duży -wyciskanie, nie oddała kału samodzielnie- opróżniłam ręcznie końcowy odcinek prostaty- 2 próba kału do badania

wlew kroplowy i.v ringer 120 ml bez duphalyte bo zjadła spore śniadanie

vetergesic na bł. śluzowe

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Sol 250 ml NaCl:GLUKOZA 1:1 1 szt.

Dawkowanie: 100 i.v

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml * 5amp. 1 5amp.

OLEJ PARAFINOWY / 1 L 2 ML

Lactulosum na ml 2 szt.

SYNERGAL INIEKCJA / 50ML 0,15 ML

Inne materiały 1 szt

VETERGESIC VET 0,3 MG/ML ROZTW DO WSTRZ. 0,1 ml

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zalecenia:

-została jeszcze jedna próba kału do pobrania

Zarejestrował: lek. wet. Magdalena Pokorska-Wójcik

02/01/2017 09:31: Badanie

Temperatura: 38,6°C

Waga: 2,56 kg

Opis wywiadu: Czuje się dobrze, mruczy. Bardzo chętnie zjadła śniadanko.

Samodzielnie oddała mocz - zasiusiany kocyk.

Opis badania:

KOREKTURA KK MIEDNICZNYCH - w normie, taczowanie na kk mm ujemne, próba z krawędzią stołu ujemna - fałszywie?

błony śluzowe różowe, ww chłonne niepowiększone, w obrębie jamy ustnej jedna mikronadżerka, osłuchiwanie uniemożliwione przez mruczenie, brzuch miękki, kał zalegający w prostnicy, pęcherz moczowy próżny

oddała sporą porcję dość miękkiego, śliskiego kału

dzisiaj jeszcze podaję wlew i.v.

Zabiegi

[Pobył doba bezdomne](#)

Zastosowane leki

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml * 5amp. 1 5amp.

OLEJ PARAFINOWY / 1 L 2 ML

Lactulosum na ml 2 szt.

SYNERGAL INIEKCJA / 50ML 0,15 ML

Inne materiały 1 szt

VETERGESIC VET 0,3 MG/ML ROZTW DO WSTRZ. 0,1 ml

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Sol 250 ml Ringer 1 szt.

Test vetexpert giardia 10szt 1 szt.

Dawkowanie: UJEMNA

Zalecenia:

- Torbugesic 0,1 ml 2 razy dziennie

- Olej parafinowy + laktuloza 1:1 2 razy dziennie

- konsultacja neurologiczna i ortopedyczna 3.01. godzina 16.00 lek.wet. Jacek Sobczyński i dr Lipiński

- wskazane badanie USG jamy brzusznej + zdjęcia RTG - poniedziałek dr Czubaj i dr Misiak

- pęcherz - obserwujemy i sprawdzamy, czy siusia sama

- jeśli jutro samopoczucie ok to możemy zdjąć wenflon

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

02/01/2017 09:39: -

Zabiegi

[Kał pasożyty](#)

Zarejestrował: AA Laboratorium

02/01/2017 18:25: Badanie

Opis wywiadu: podano 0,01 dexdomitoru, 0,01 butomidoru

efekt bardzo lekkiej, krótkiej sedacji

na zdj RTG widoczne złamanie kości kulszowej lewej, złamanie kompresyjne L7 z uwolnieniem dobrzuszego

fragmentu trzonu kegu po stronie prawej, cechy kręgozmyku z przesunięciem się osi długiej L7 na stronę lewą,

w bad usg bez widocznych zmian

Zabiegi

[Rtg bezdomne 0,5](#)

[USG pomocnicze 0,7](#)

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

03/01/2017 13:42: Badanie

Opis wywiadu: rano nie chciała zjeść
poza tym samopoczucie bez zmian
dzisiaj rano bez kału
wczoraj wieczorem oddawała mocz pod siebie samodzielne

Opis badania:

po podłączeniu płynów zjadła bardzo chętnie
dzisiaj jeszcze płyny iv i zdjęcie wenflonu
wieczorem konsultacja neuro/orto
w bad klinicznym jak wcześniej
postawiona na ziemi potrafi stanąć na kończynach i zjeść posiłek w pozycji stojącej

w bad kału toxocara
1/4 tabletki aniprazol przez 3 kolejne dni
dzisiaj podano pierwszą dawkę

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml * 5amp. 1 5amp.

OLEJ PARAFINOWY / 1 L 2 ML

Lactulosum na ml 2 szt.

SYNERGAL INIEKCJA / 50ML 0,15 ML

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Sol 250 ml Ringer 1 szt.

Aniprazol tabl 1 szt.

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

03/01/2017 17:45: -**Zabiegi**

VETLAB -FRUKTOZAMINA

Zarejestrował: AA Laboratorium

03/01/2017 20:49: Badanie

Opis wywiadu: Kotka znaleziona po urazie w okolicach świąt.

Opis badania:

W badaniu neurologicznym porusza się samodzielnie, korektura opóźniona w kk.mm.
W kk.pp bez zmian i taczowanie bez zmian. W kk.mm. przy taczowaniu widoczny odruch wykrocny.

Czucie bólu głębokiego zachowane w obrębie kończyn miednicznych, brak w obrębie ogona.
Ogon wiszący, nieruchomo.

W badaniu odruchów rdzeniowych - osłabione odruchy zginania obustronnie, rzpekowy, kulszowy i odpuszczelowy zachowane.

Na RTG widoczne złamanie kręgu L7 z przemieszczeniem osi długiej kręgosłupa w stronę dogrzbietową lewą,
widoczne złamanie kości kuszlowej lewej i kręgozmyk S3-Cd1.

W badaniu palpacyjnym pęcherz próżny, lekka koprostaza.
Z wywiadu w szpitalu kot raczej oddaje mocz świadomie. Nic nie wskazuje na to aby mocz swobodnie wyciekał.
Momentami ma opóźniany pęcherz przez wyciskanie.

Zalecenia:

- proszę o utrzymanie ab i leków p/bólowych
- skonsultuję się z chirurgami w celu wykonania repozycji L7-S1 i wykonania laminectomi, odbarczającej, oraz wysokiej amputacji ogona.
- do czasu zabiegu ograniczenie ruchu!! klatka
- proszę o obserwację mikcji i w miarę możliwości o ustalenie czy kot oddaje mocz samodzielnie za jednym razem i czy nie wycieka mu podczas snu? Najlepiej w miarę możliwości proszę o ocenę wielkości pęcherza 2 x dziennie rano i wieczorem. W przypadku przepełnienia pęcherza opróżnianie przez wyciskanie.

Zabiegi

[Konsultacja Neurologiczna 0,7](#)

Zarejestrował: lek. wet. Jacek Sobczyński

03/01/2017 21:18: Badanie

Opis wywiadu: pęcherz moczowy bardzo mały, nie opróżniam

Zastosowane leki

VETERGESIC VET 0,3 MG/ML ROZTW DO WSTRZ. 0,1 ml

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

04/01/2017 12:59: Badanie

Opis wywiadu: czuje się dobrze, zjadła

porusza się na 4 kończynach

sama siusia

oddala kał- uformowany

Opis badania:

śluzówki różowe

ww.chłonne niepowiększona

jama ustna bez zmian

brzuch miękki, pęcherz opróżniony, wyczuwalne zbite masy kałowe w prostnicy

w związku z zaleganiem kału jeszcze w jelitach- ringer 120 ml s.c + laktuloza 2 ml

podanie aniprazolu 1/4 tabl

Zabiegi

[Pobył doba bezdomne](#)

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

SYNERGAL INIEKCJA / 50ML 0,2 ML

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml * 5amp. 1 5amp.

Lactulosum na ml 2 szt.

Sol 250 ml Ringer 1 szt.

Dawkowanie: 120 ml s.c

VETERGESIC VET 0,3 MG/ML ROZTW DO WSTRZ. 0,1 ml

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Zalecenia:

- kontynuacja synergalu i reszta zaleceń dr. Sobczyńskiego

-jutro ostatnia dawka aniprazolu, powtórka po 2 tygodniach

Zarejestrował: lek. wet. Magdalena Pokorska-Wójcik

05/01/2017 09:29: Badanie

Opis wywiadu: Samopoczucie bardzo dobre, zjadła bardzo chętnie. Mocz w kuwecie. Kału nie oddała.

Opis badania:

błony śluzowe różowe, ww chłonne niepowiększone, brzuch miękki, niebolesny, jelita zgazowane, bez kału zalegającego w prostnicy, pęcherz moczowy próżny

Podano ostatnią dawkę aniprazolu

Zabiegi

[Pobył doba bezdomne](#)

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

SYNERGAL INIEKCJA / 50ML 0,2 ML

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml * 5amp. 1 5amp.

VETERGESIC VET 0,3 MG/ML ROZTW DO WSTRZ. 0,1 ml

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Zalecenia:

- powtórzenie odrobaczenia za 2 tygodnie

- wieczorem Vetergesic

- zabieg chirurgiczny w najbliższy poniedziałek - potwierdzono u Pani Kaliny - kontakt w sprawie godziny zabiegu

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

06/01/2017 11:57: Badanie

Opis wywiadu: Mocz oddała do kuwety. Kału nie było

Bardzo chętnie zjadła

Zabiegi

[Pobył doba bezdomne](#)

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

SYNERGAL INIEKCJA / 50ML 0,2 ML

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml * 5amp. 1 5amp.

VETERGESIC VET 0,3 MG/ML ROZTW DO WSTRZ. 0,1 ml

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Zarejestrował: lek. wet. Anna Misiak

07/01/2017 16:16: Badanie

Opis wywiadu: oddał mocz/kał do kuwety

czuje się dobrze

aktywna,

w poniedziałek zabieg na bemowie!

Opis badania:

w bad jak wcześniej

Zabiegi

[Pobył doba bezdomne](#)

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

SYNERGAL INIEKCJA / 50ML 0,2 ML

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml * 5amp. 1 5amp.

VETERGESIC VET 0,3 MG/ML ROZTW DO WSTRZ. 0,1 ml

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

08/01/2017 09:26: -

Zabiegi

[Pobył doba bezdomne](#)

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

SYNERGAL INIEKCJA / 50ML 0,2 ML
SOLVERTYL inj. 50mg/2ml * 5amp. 1 5amp.
VETERGESIC VET 0,3 MG/ML ROZTW DO WSTRZ. 0,1 ml
BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps
Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

09/01/2017 09:27: Badanie

Opis wywiadu: Samopoczucie super, apetyt w normie. Pęcherz próżny.

Opis badania:

w badaniu klinicznych bez odchyień od normy

Dzisiaj zabieg na Bemowie u prof. Sterny - 12h na czczo.

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

SYNERGAL INIEKCJA / 50ML 0,2 ML

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml * 5amp. 1 5amp.

VETERGESIC VET 0,3 MG/ML ROZTW DO WSTRZ. 0,1 ml

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

10/01/2017 20:07: Badanie

Opis wywiadu: Przyjmuję kotkę z powrotem do szpitala. Wczoraj wykonano zabieg amputacji ogona, odstąpiono od zabiegu stabilizacji kręgosłupa.

Kotka czuje się dobrze, do czasu zdjęcia szwów w kołnierzu.

Na bemowie przerwano leczenie synergalem.

Opis badania:

Porusza się z niedowładem, korektura obu kk miednicznych w normie.

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Zalecenia:

- jutro do podania Clamoxyl oraz Metacam zgodnie z zaleceniami z Bemowa (podpięte w karcie)

- 19.01 zdjęcie szwów

- do czasu zdjęcia szwów konieczny kołnierz

- kontrola oddawania moczu i kału

- 17.01 powtórzenie odrobaczenia

- dalsze zalecenia zależnie od samopoczucia

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

11/01/2017 09:03: Badanie

Temperatura: 38,0°C

Opis wywiadu: czuje się dobrze, ma apetyt

Opis badania:

śluzówki różowe

ww.chłonne niepowiększone

brzuch miękki, niebolesny, pęcherz mały

szew suchy, bez wysięku, lekki obrzęk tkanek wokół

lekki niedowład kk mm w ruchu

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Betamox L.A. / 100ml 0,3 ml

LOXICOM 5MG 0,15 ml.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Hepatialle forte small&cats 40 kaps 1 szt.

Zalecenia:

- ze względu na podwyższone parametry wątrobowe w ostatnim bad - w pt 13.01- kontrola krwi- parametrów wątrobowych po zabiegu

- hepatialle 1kaps 1 x dziennie

- 19.01 -zdjęcie szwów

- do czasu zdjęcia szwów kołnierz

-17.01 powtórne odrobaczenie

- kontrola oddawania moczu i kału

Zarejestrował: lek. wet. Magdalena Pokorska-Wójcik

12/01/2017 11:04: Badanie

Opis wywiadu: Samopoczucie bardzo dobre, apetyt w normie. Kał i mocz oddaje do kuwety.

Opis badania:

w badaniu klinicznym bez odchyleń (oprócz niedowładu kk miednicznych)

szew suchy, bez wysięku

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Hepatialle forte small&cats 40 kaps 1 szt.

Zalecenia:

- hepatialle 1kaps 1 x dziennie

- 19.01 -zdjęcie szwów

- do czasu zdjęcia szwów kołnierz

-17.01 powtórne odrobaczenie

- kontrola oddawania moczu i kału

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

13/01/2017 09:22: Badanie

Temperatura: 37,5°C

Opis wywiadu: czuje się dobrze, ma apetyt

Opis badania:

śluzówki różowe
ww.chłonne podżuchwowe niepowiększone
jama ustna bez zmian

brzuch miękki, niebolesny
niedowład kk.mm bez zmian

rana pooperacyjna goi się prawidłowo, mniejszy obrzęk , szew suchy, bez wysięku
już bez betamoxu

Zabiegi

[Pobył doba bezdomne](#)

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Hepatiale forte small&cats 40 kaps 1 szt.

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zalecenia:

- aniprazol od 17.01 przez 3 dni

-zdjęcie szwów 19.01

-hepatiale 1 kaps 1 x dziennie, za miesiąc kontrolne bad. krwi

-zaczynamy rehabilitację, do czasu zdj szwów 1x dziennie pole magnetyczne, potem decyzje czy coś jeszcze

Zarejestrował: lek. wet. Magdalena Pokorska-Wójcik

13/01/2017 17:41: Badanie

Opis wywiadu: pole magnetyczne 13.01 i 16.01

Zabiegi

[Fizjoterapia 30](#)

Zarejestrował: inż. Elżbieta Grzyb

14/01/2017 14:54: Badanie

Opis wywiadu: Samopoczucie bardzo dobre, apetyt w normie.

Opis badania:

w badaniu klinicznym bez dodatkowych odchyień, rana pooperacyjna wygląda bardzo ładnie, bez wysięku, bez obrzęku okolicznych tkanek

Zabiegi

[Pobył doba bezdomne](#)

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Hepatiale forte small&cats 40 kaps 1 szt.

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zalecenia:

- aniprazol od 17.01 przez 3 dni

-zdjęcie szwów 19.01

-hepatiale 1 kaps 1 x dziennie, za miesiąc kontrolne bad. krwi

-zaczynamy rehabilitację, do czasu zdj szwów 1x dziennie pole magnetyczne, potem decyzje czy coś jeszcze

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

15/01/2017 10:05: -

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Hepatialle forte small&cats 40 kaps 1 szt.

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

16/01/2017 10:02: Badanie

Temperatura: 38,1°C

Waga: 2,3 kg

Opis wywiadu: Czuje się bardzo dobrze, apetyt w normie.

Opis badania:

blony śluzowe różowe, ww chłonne podżuchwowe niepowiększone, osłuchowo bez nieprawidłowości, jelita zgazowane

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Hepatialle forte small&cats 40 kaps 1 szt.

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zalecenia:

- aniprazol od 17.01 przez 3 dni

-zdjęcie szwów 19.01

-hepatiale 1 kaps 1 x dziennie, za miesiąc kontrolne bad. krwi

-zaczynamy rehabilitację, do czasu zdj szwów 1x dziennie pole magnetyczne, potem decyzje czy coś jeszcze

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

16/01/2017 16:10: Badanie

Opis wywiadu: pole magnetyczne

Zarejestrował: mgr. Janina Dabrowska

17/01/2017 10:54: Badanie

Opis wywiadu: pole magnetyczne - solenoid

Zabiegi

Fizjoterapia 15

Zarejestrował: mgr. Janina Dabrowska

17/01/2017 11:35: Badanie

Opis wywiadu: czuje się dobrze

aktywna

ma apetyt

Opis badania:

temp 38

okolica rany goi się prawidłowo

w pozostałym badaniu jak wcześniej

podanie aniprazolu 1/4 tabletki

dzisiaj pierwszy raz magnetoterapia

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Hepatialle forte small&cats 40 kaps 1 szt.

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Aniprazol tabl 1 szt.

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

18/01/2017 08:42: Badanie

Opis wywiadu: pole magnetyczne

Zabiegi

Fizjoterapia 15

Zarejestrował: inż. Elżbieta Grzyb

18/01/2017 13:52: Badanie

Opis wywiadu: czuje się dobrze, aktywna

Opis badania:

śluzówki różowe

jama ustna bez zmian

brzuch miękki, niebolesny

nadal niezdolność kończyn miednicznych na podobnym poziomie

aniprazol po. 1/4 tabl

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zalecenia:

-jutro zdjęcie szwów

-rehabilitacja- magnetoterapia bez zmian

-hepatiale 1 kaps 1x dz

Zarejestrował: lek. wet. Magdalena Pokorska-Wójcik

19/01/2017 08:38: Badanie

Opis wywiadu: magnetoterapia

Zabiegi

Fizjoterapia 15

Zarejestrował: mgr. Janina Dabrowska

19/01/2017 10:05: Badanie

Temperatura: 38,5°C

Opis wywiadu: samopoczucie bardzo dobre, apetyt w normie

Opis badania:

błony śluzowe różowe, wyciek ropny z obu oczu, spojówki bez stanu zapalnego, ww chłonne podzuchwowe
niepowiększone, osłuchowo bez nieprawidłowości, korektura prawidłowa w kk miednicznych

dzisiaj ostatnia dawka aniprazolu

zdjęcie szwów

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Aniprazol tabl 1 szt.

Zalecenia:

- za 2 tygodnie powtórzenie aniprazolu

- za tydzień szczepienie na choroby zakaźne

- na razie zdejmuję kołnierz - jeśli będzie się wylizywać zakładamy z powrotem

- hepatiale 1 kaps

- rehabilitacja magnetoterapia - do rozważenia bieżnia wodna (zależnie od zachowania kotki w wodzie)

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

20/01/2017 09:20: Badanie

Opis wywiadu: pole magnetyczne

EG: próba bieżni wodnej, 5 min v=1-1,5 poprawnie stawiane KKMM (uwaga bo szybko wyskakuje!)

Zabiegi

Fizjoterapia 15

Zarejestrował: mgr. Janina Dabrowska

20/01/2017 15:00: Badanie

Opis wywiadu: czuje się dobrze

Opis badania:

śluzówki różowe

brzuch miękki niebolesny

jama ustna bez zmian

na ogonie sucho, w jednym końcu szwu jeszcze skóra nie do końca wygojona- do obserwacji czy kotka sobie nie rozliże

ruchowo bez zmian

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Hepatiale forte small&cats 40 kaps 1 szt.

Zalecenia:

-rehabilitacja -magnetoterapia, w przyszłym tygodniu próba z bieżnią wodną

-za 2 tygodnie powtórzenie aniprazolu

-za tydzień szczepienie na choroby zakaźne

-hepatiale bez zmian

-kontrola ogona,w razie wylizywania kołnierz

Zarejestrował: lek. wet. Magdalena Pokorska-Wójcik

21/01/2017 16:34: Badanie

Opis wywiadu: czuje się dobrze

Opis badania:

w badaniu jak wcześniej

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Hepatiale forte small&cats 40 kaps 1 szt.

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

22/01/2017 14:30: -

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Hepatiale forte small&cats 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 0,5 szt

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

23/01/2017 10:27: Badanie

Opis wywiadu: samopoczucie super, apetyt w normie

Opis badania:

blony śluzowe różowe, ww chłonne żuchwowe niepowiększone, brzuch miękki, niebolesny, na prawej kończynie miedniczej obszar wyłysienia, prawdopodobnie wylizala łapkę - lekki wysięk zapalny

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Hepatiale forte small&cats 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 0,5 szt

Velvetyna antybakteryjna maść 1 ml

Zalecenia:

-rehabilitacja -magnetoterapia, na razie bez bieżni ze względu na ranę - zapisana na ten tydzień

- od 3.01 powtórka Aniprazolu

- 27.01 szczepienie na zakaźne

-hepatiale bez zmian

- toaleta rany velvetyną, kołnierz ochronny!!

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

24/01/2017 09:17: Badanie

Opis wywiadu: pole magnetyczne

Zabiegi

Fizjoterapia 15

Zarejestrował: inż. Elżbieta Grzyb

24/01/2017 15:39: Badanie

Opis wywiadu: czuje się dobrze

po zdjęciu kołnierza od razu wylizuje łapkę

Opis badania:

okolica rany bez włosa, pogrubiała skóra, bez wysięku - toaleta, podano velvetynę

poza tym jak wczoraj

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Hepatialle forte small&cats 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 0,5 szt

Velvetyna antybakteryjna maść 1 ml

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

25/01/2017 09:46: Badanie

Temperatura: 39,9°C

Opis wywiadu: nie zjadła śniadania

osowiała

mocz i kał prawidłowy

Opis badania:

śluzówki różowe

w jamie ustnej bez zmian

ww.chłonne podzuchwowe miernie powiększone, lekko podkolanowe

brzuch miękki, niebolesny

osłuchowo bez zmian nad polem płucnym, bez patologii z gdo, serce miarowe

lekko tkliwe gardło

założenie wenflonu i wlew i.v 120 ml |NaCl

p/gorączkowo tolfine 0,3 ml s.c

ranka na stopie z lekkim obrzękiem, bez fluktuacji płynu pod skórą, smarowanie velvetyną

zebrane wszystkie próby kału do badania

na usg-NCz bez zmian

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,3 ML

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml * 5amp. 0,2 5amp.

Sol 250 ml NaCl 1 szt.

Dawkowanie: 120 ml i.v

Zalecenia:

- obserwacja i kontrola temperatury

-jeśli będzie się utrzymywała gorączka ,dalsze badania, dołączenie antyby-- np. enrofloksacyny

-czekamy na wyniki badań kału

-codzienna toaleta ranki na stopie, velvetyna +kołnierz

Zarejestrował: lek. wet. Magdalena Pokorska-Wójcik

25/01/2017 10:00: Badanie

Opis wywiadu: magnetoterapia

Zabiegi

Fizjoterapia 15

Zarejestrował: inż. Elżbieta Grzyb

25/01/2017 10:12: -

Zabiegi

VETLAB-KAŁ FLOTACJA

Zarejestrował: AA Laboratorium

26/01/2017 09:44: Badanie

Temperatura: 38,8°C

Opis wywiadu: Samopoczucie dużo lepsze, zjadła normalnie. Dzisiaj bez gorączkowania. Wyniki badania kału ujemne.

Opis badania:

błony śluzowe różowe, ww chłonne żuchwowe miernie powiększone, osłuchowo bez nieprawidłowości, brzuch miękki, niebolesny, ranka na stopie bez większej poprawy - posmarowano velvetyną

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,3 ML

Sol 250 ml NaCl 1 szt.

Dawkowanie: 100 ml i.v.

Velvetyna antybakteryjna maść 1 ml

Zalecenia:

- dzisiaj jeszcze na wszelki wypadek wlew dożylny, jutro zależnie od samopoczucia i temperatury

- toaleta rany

- szczepienie do uzupełnienia, jeśli kotka będzie się czuła dobrze

- magnetoterapia jak wcześniej

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

26/01/2017 20:12: Badanie

Opis wywiadu: magnetoterapia

Zabiegi

Fizjoterapia 15

Zarejestrował: inż. Elżbieta Grzyb

27/01/2017 10:42: Badanie

Temperatura: 40,8°C

Opis wywiadu: zjadła śniadanie

ale wróciła gorączka

kal i mocz w normie

Badanie kału - UJEMNE

Opis badania:

śluzówki różowe

spojówki przekrwione i rozpulchnione, wyciek surowiczy

gardło przekrwione, lekko tkliwe

osłuchowo nieznaczne rżżenia z gdo, oskrzela bez zmian

brzuch miękki, niebolesny

dziś jeszcze kroplówka

dołączam synergal

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

SYNERGAL inj. 100ml 0,2 ml

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,3 ML

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Sol 250 ml NaCl 1 szt.

Dawkowanie: 120 ml i.v

Hepatiale forte small&cats 40 kaps 1 szt.

Zalecenia:

-synergall 0,2 ml 1x dz

-leki p/zapalne i wlew zależnie od stanu

-lizyna w żelu doustnie 2x dziennie po 2 m l

-bioimmunex felis 1 kaps 1 xdz

-hepatiale 1 kaps 1x dz

-inhalacje 1 x dz

Zarejestrował: lek. wet. Magdalena Pokorska-Wójcik

28/01/2017 12:17: Badanie

Temperatura: 38,7°C

Opis wywiadu: Zjadła chętnie śniadanie, czuje się lepiej

Opis badania:

błony śluzowe różowe, gardło zaczerwienione, wypływ z oczu bez zmian, węzły chłonne żuchwowe nieznacznie powiększone, szmer nad gdo brzuch miękki niebolesny

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

SYNERGAL inj. 100ml 0,2 ml

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Hepatiale forte small&cats 40 kaps 1 szt.

Zalecenia:

-synergall 0,2 ml 1x dz

-lizyna w żelu doustnie 2x dziennie po 2 m l

-bioimmunex felis 1 kaps 1 xdz

-hepatiale 1 kaps 1x dz

-inhalacje 1 x dz

Zarejestrował: lek. wet. Anna Misiak

29/01/2017 14:01: Badanie

Temperatura: 38,6°C

Opis wywiadu: Wydaje się trochę osowiała, nie gorączkuje. Kicha.

Podano hepatiale, bioimmunex, syergal. Ranę na łapce posmarowano velvetyną. Miała inhalacje.

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 0,5 szt
Hepatialle forte small&cats 40 kaps 1 szt.
Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.
SYNERGAL inj. 100ml 0,2 ml
Zarejestrował: mgr Monika Niewolewska

30/01/2017 12:42: Badanie

Temperatura: 37,4°C
Waga: 2,23 kg
Opis wywiadu: Czuje się ok, apetyt w normie. Zdarza jej się kichać.

Opis badania:

błony śluzowe różowe, ww chłonne żuchwowe niepowiększone, osłuchowo bez zmian, w kanałach słuchowych
mierna ilość woszczyzny - wyczyszczono, brzuch miękki, niebolesny, wenflon wyjęto

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 0,5 szt
Hepatialle forte small&cats 40 kaps 1 szt.
Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.
SYNERGAL inj. 100ml 0,2 ml

Zalecenia:

-synergall 0,2 ml 1x dz - jeśli bez poprawy to za parę dni do rozważenia zmiana na Unidox

-lizyna w żelu doustnie 2x dziennie po 2 m l

-bioimmunex felis 1 kaps 1 xdz

-hepatiale 1 kaps 1x dz

-inhalacje 2 x dz

- velvetyna na zmianę na łapce 2 razy dziennie (na razie kołnierz)

- magnetoterapia 1 raz dziennie - na razie zapisana na najbliższy tydzień

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

30/01/2017 22:34: Badanie

Opis wywiadu: pole magnetyczne

Zabiegi

Fizjoterapia 15

Zarejestrował: mgr. Janina Dabrowska

31/01/2017 14:24: Badanie

Opis wywiadu: czuje się dobrze
samopoczucie raczej bez zmian
apetyt zachowany

Opis badania:

temp 38
w bad klinicznym jak wcześniej
ponieważ nie pojawiają się nowe objawy zostawiam synergall
toaleta okolicy śródstopia

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 0,5 szt

Hepatialle forte small&cats 40 kaps 1 szt.

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

SYNERGAL inj. 100ml 0,2 ml

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

Podpis lekarza weterynarii