



Przychodnia Weterynaryjna BIAŁOBRZESKA

www.bialobrzaska.waw.pl

e-mail: bialobrzaska@o2.pl

02-344 Warszawa

Telefon: 022 824 29 46; Fax: 022 882 98 66

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 8.00-22.00

sobota-niedziela 10.00-16.00

Właściciel

dane opiekuna do wiadomości Fundacji

Zwierzę

Dzeki

Gatunek: pies

Rasa: mieszaniec

Płeć: samiec

Wiek: 11 lat

Oznakowanie:

Maść: tricolor

Karta informacyjna wizyty

26/05/2017 16:32: Badanie

Opis wywiadu: miał około 2 lat temu zabieg cystotomii

od jakiegoś czasu przed oddaniem moczu kropelkuje, oddaje mocz też mocz w domu

bardzo brzydki zapach moczu, pojawia się krew i skrzepy, przy oddawaniu moczu wyraźny dyskomfort

Opis badania:

*T 38,8C

*okolica pęcherza bolesna

*bolesność przy badaniu rektalnym

*prostata w usg powiększona bez zmian w mięszu

*w usg pęcherza gruba ściana, zapalenie, osad ze skrzepami krwi? pęcherz miernie wypełniony

*trudność we wprowadzeniu cewnika, po wyjęciu fontanna krwistego moczu ze skrzepami o brzydkim zapachu - oddano do badania

Zabiegi

materiały (strzykawki, igły, śr. dezynf.)

WIZYTA PROFILAKTYCZNA

Zastosowane leki

Cewnik dla psa 2,0 x 500mm 1 szt.

Enrocin 5% inj. 28 ml

Melovem inj. 5 mg/ml 100 ml 1,2 ml

* przy stosowaniu tego leku wskazane jest podawanie jednocześnie leków zmniejszających wydzielanie soku żołądkowego (omeprazolu, ranitydiny, famotydiny lub misoprostolu)

Sol.NaCl 0.9% 250ml 150 ml

Zalecenia:

*enrocin antybiotyk w zastrzyku - raz dziennie podskórnym od soboty, na pewno przez 2 tygodnie (istnieje możliwość zamiany na tabletki ale są droższe)

*no-spa 40mg - 1/2 tabletki co 8-12 h przez najbliższe kilka dni

*cyclonaminum - 3 razy dziennie 1/2 tabletki aż do ustąpienia krwimoczmu

*melovem zastrzyk przeciwbólowy - podskórnym w niedzielę i wtorek

*urosept - 2 razy dziennie 1 tabletką