



Właściciel

DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Lekarz prowadzący: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Zwierzę

Gatunek: kot
Rasa: europejski
Płeć: samica
Wiek: 1 rok i 4 miesiące
Oznakowanie:
Maść:

Historia wizyt

13/04/2019 20:47: BADANIE

OPIS WYWIADU

dom tymczasowy kotka z 9 kociętami. wczoraj adoptowana z interwencji ze schroniska, podawany difadol gentamycyna dla kociat 2x dziennie i betamox. dorosła kocica nie sikala

OPIS BADANIA

Kocica wystraszona, bł śluzowe jasno różowe wilgotne crts2s, osłuchowo b/z, ww chłonne nie powiększone, Sutki, gruczoły mlekowe bez cech zapalenia, tyłobrzusze lekko tkliwe, brak wypływu z dróg rodnych. Wdrożenie antybiotyku na 5-7 dni.

Zalecone badanie kału 3x probki dorosłej kocicy i potem odrobaczenie.
1 odrobaczenie kociat za tydzień

kontynuacja kropli do oczu ale 3-4x dziennie

od jutra synulox dla 4 kociat z obrzękiem spojówek zaschniętym wypływem w kacie oka (1 kociak najmniejszy obrzęk rogówki) i matki na 5-7 dni
uszy czyste, koty bez wad wrodzonych
espumisan na wzdęte brzuszki
jutro wizyta

ZABIEGI

WIZYTA DOMOWA<150> 1,5
DOJAZD - BLISKI (do 5 km)
POBRANIE WYMAZU
WYKONANIE TESTU DIAGNOSTYCZNEGO
swierzbowiec uszny- brak w preparacie pod mikroskopem
KROPLÓWKA s.c.
Materiały <5>
Materiały <5>

ZASTOSOWANE LEKI

Betamox 100 ml	1	ml
<i>Dawkowanie: 0,05 ml sc dla 10 kociat</i>		
Synulox inj 50ml	0,15	ml
<i>Dawkowanie: sc</i>		
<i>matka</i>		
Milvet MLEKO	1	op

Historia wizyt

BUTELKA DO KARMIENIA TRIx	1	SZT
SOLUTio RINGERI 250 ml	1	szt.
<i>Dawkowanie: 150 sc</i>		
Duphalyte	10	ml

 Zarejestrowa! DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

14/04/2019 22:30: BADANIE

OPIS WYWIADU

kontynuacja, kotka sika luzna kupa zebrana do probki 1 dzien, zjada mleko dla kociat, jest w lepszym stanie

OPIS BADANIA

kotka: bl sluzowe jasno rozowe wilgotne crt2s, osluchowo b/z, brzuch napiety stresowo mniejsza obrona miesniowa niz wczoraj

kotki dokarmiane, dzis bez wzdetych brzuszkw, mniejszy obrzek spojowek u tych najmniejszych. Jutro kontynuacja betamoxu tylko u kociat w obrzekiem spojowek (4-5 kocieta), reszta stada krople do oczu przez kolejne 3-4 dni 4-5 x dziennie. Po tym czasie krople na kolejne 7 dni tylko u kociat z obrzekiem i zaczerwienieniem spojowek. od 20.04 pierwsze odrobaczenie kociat

ZABIEGI

WIZYTA DOMOWA - kontyn.<80>
DOJAZD - BLISKI (do 5 km)

ZASTOSOWANE LEKI

GENTAMICIN 0.3%	1	op
DIFADOL 0,1	1	op
DIET CAN/FEL RECOVERY 200g	2	szt
DIET CAN/FEL CONVALESC instnt	2	sasz
Lydium 5mg	1	ml
Synulox inj 50ml	0,15	ml
SOLUTio RINGERI 250 ml	1	szt.
<i>Dawkowanie: 120 ml sc</i>		
Duphalyte	15	ml
SYNULOX tabl 50 mg	6	szt
<i>Dawkowanie: 2/3 tabl 2x dziennie przez 3 dni</i>		
FORTIFLORA CAT	4	sasz

 Zarejestrowa! DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

15/04/2019 23:49: BADANIE

OPIS BADANIA

kotka ok, mleka dla kociat juz nie chce, je tylko gourmenta ale zjada, malo zajmuje sie mlodymi ale karmi je grzecznie;

maluchy: 3 najslabsze jeszcze obrzkniete spojowki, dostaly betamox, chomiczek zgazowane lekko jelita ale bardzo czesto dokarmiany, dostal espumisan;
pozostale kociaki ladnie jedza, zywtne, zaczynaja byc ciekawe swiata; oczy ladne, bez obrzeku, spojowki rozowe, brzuszki pelne ale bez zgazowania; 3 najgorsze kropimy dalej 5 razy dziennie genta + diafdol; te w porzadku genta 3 razy dziennie, diafol do wyczerpania; dokarmiane kociaki sa mlekiem zastepczym i normalnie karmione przez

matkę;

 ZABIEGI

WIZYTA DOMOWA - kontyn.<80>
DOJAZD - BLISKI (do 5 km)

 ZASTOSOWANE LEKI

Betamox 100 ml	0,15	ml
<i>Dawkowanie: 3x po 0,05</i>		
ESPUMISAN KROPLE 100MG/ML 30ML	0,1	ml
Milvet MLEKO	1	op
DIET CAN/FEL CONVALESC instnt	2	sasz

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!**20/04/2019 12:35: BADANIE** **OPIS WYWIADU**

Pani podała dzisiaj Milpro matce.

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!**23/04/2019 19:47: BADANIE** **OPIS WYWIADU**

wizyta kontynuacja

 OPIS BADANIA

Przegląd kociaków- wszystkie bardzo żywotne, przybierają ładnie na wadze, nie pobierają jeszcze same pokarmu, ale dokarmia je właścicielka (rc recovery i rc starter) i jedzą też od mamy; waga od 0,3kg do 0,5 kg; oczy już ładne, suche, spojówki nieprzekrwione, u dwóch najmniejszych jeszcze odrobinkę obrzęk i pojedyncze epizody wypływu (kontynuujemy jeszcze gentamycynę 3-4 dni 2x dziennie i koniec; jeśli byłby nawrót trzeba już inny antybiotyk ze wzgl na szybka antybiotykooporność na gentamycynę)

brzuski miękkie, niewzdęte, nakarmione;
u wszystkich obecne już ząbki mleczne mniej lub bardziej wyrośnięte;
odrobaczenie za ok tydzień;

matka schudła ale dokarmia ją Pani rc liquid recovery; pobrany kał na pasożyty i giargia

 ZABIEGI

WIZYTA DOMOWA - kontyn.<80>
DOJAZD - BLISKI (do 5 km)
ZASTRZYK ZE SKIEROWANIA
3 koty po sterylizacji kontynuacja antybiotyku (Pani miała swój w strzykawkach)
Materiały <5> 0
PRZYJĘCIE MATERIAŁU
LAB WET BADANIE KAŁU PASOŻYTY + GIARGIA <78>

 ZASTOSOWANE LEKI

DIET CAN/FEL RECOVERY 200g	2	szt
GENTAMICIN 0.3%	1	op

 Zarejestrowa! DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

 LAB-WET		Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne 02-881 Warszawa ul. Wita Stwosza 30 tel./fax: 22 852-45-28 , Złocień 501-782-940 e-mail: biuro@labwet.pl www.labwet.pl			
Książęca Pogotowie Weterynaryjne "WET6" Książęca 3 00-418 Warszawa		Nr mat. Nr kontr: 187 Data: 2018-04-24			
		Jedn. kier:			
Nr zlecenia: 970346/19 Właściciel: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI Adres: VIVA!		Rasa zw. Gatunek: KOT Wiek zw. Imię zw. KLARA			
Badanie	Wynik	Jedn.	min	max	norma
Kat - Badanie mikroskopowe: Fascyto	Negatywny				
Kat - Giardia intestinalis Giardia intestinalis	Negatywny				

Dokument elektroniczny, nie wymaga podpisu i pieczęci

28/04/2019 20:32: BADANIE

OPIS WYWIADU

Bardzo mało je, osowiała, prycha przy kontakcie

OPIS BADANIA

bł. śluzowe bladoróżowe, lepkie
 w. chłonne podżuchwowe niepowiększone
 brzuch miękki, bolesny
 odwodnienie
 C-39,4!

decyzja o zabraniu pacjenta do szpitala na kroplówki dożylnie, dokładne badanie kliniczne, krew (p. diagnostyczny rozszerzony, tarczycyca, toxoplazmoza na życzenie pani)

W szpitalu założono wenflon, pobrano krew, podano nacl 100ml + 20ml duphalyte, enrobiofloxx, tolfedine, czekamy na wyniki krwi

pani chce dziś zabrac kota, zostawimy wenflon i jutro kontynuacja

wszystkie badania i ich ceny skonsultowano z pania i uzyskano zgode

ZABIEGI

Alab jedno oznaczenie 4,5

pasowały flotacja, sedymentacja, giargia test

PRZYJĘCIE MATERIAŁU

WIZYTA DOMOWA<150>

DOJAZD - BLISKI (do 5 km)

LAB WET Profil diagnostyczny rozszerzony <135>

LAB WET Profil tarczycowy <105>

LAB WET Toxoplazmoza IgG,IgM <110>

LAB WET JEDNO OZNACZENIE <10> 8

test fiv/felv - krew poszła już do laboratorium, nie chce pobierać 2 raz na nasz test, kotka sie stresuje i drapie (wzamian nie loguje pobrania krwi)

ZAŁOŻENIE VENFLONU

ZASTOSOWANE LEKI

Venflon 0.7 (żółte)	1	szt
NaCl 100ml	1	szt.
Tolfedine inj	0,26	ml
Duphalyte	20	ml
WLEWNIK	1	szt
SYNULOX INJ. 100 ML	0,2	ml

Zarejestrowa! DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

PEPPEREL , 20190428223437



LAB-WET
 Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne
 02-661 Warszawa ul. Wita Stwosza 30
 tel./fax 22 852-45-25 , Zlecenia 501-782-940
 e-mail: biuro@labwet.pl www.labwet.pl

Książęca Pogotowie Weterynaryjne
 "VET6"
 Książęca 3
 00-418 Warszawa

Nr mat. 140
 Nr kontr. 137
 Data: 2019-04-28


 Jedn. kier:

Nr zlecenia: 973336/19
 Właściciel: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI
 Adres: VIVA!

Rasa zw.:
 Gatunek: KOT
 Wiek zw.:
 Imię zw.: DOM

Badanie	Wynik	Jedn.	min	max	norma
Morfologia					
Leukocyty	17,80	G/l	6,0	18,0	~
Erytrocyty	8,02	T/l	6,6	10,0	~
Hemoglobina	7,60	mmol/l	6,21	9,31	~
Hematokryt	0,37	l/l	0,30	0,45	~
MCV	46	fl	39	55	~
MCH	0,96	fmo/l	0,81	1,05	~
MCHC	20,8	mmol/l	18,6	22,3	~
RDW	17	%	14	31	~
Płytki krwi	401	G/l	230	600	~
MPV	15	fl	14	18	~
Rozmaz manualny:					
Kwasochłonne	9	%	2	12	~
Palcokształtne	3	%	0	8	~
Segmentowane	63	%	35	75	~
Limfocyty	25	%	20	55	~
Obraz krwinek czerwonych:	Bez zmian				
Oznaczenia biochemiczne:					
AspAT	18,0	U/l	5	44	~
AlAT	41,0	U/l	20	107	~
ALP	126,0	U/l	19	107	U
Glukoza	118,0	mg/dl	100	130	~
Kreatynina	1,3	mg/dl	1,0	2,0	~
Mocznik	98,0	mg/dl	25	70	H
Białko całkowite	99,0	g/l	60	80	H
Bilirubina całkowita	0,6	mg/dl	0,6	1,2	~
Albuminy	32,0	g/l	27	80	~

Dokument elektroniczny, nie wymaga podpisu, pieczęci

 ALAB <i>Weterynaria</i> ANALIZY MEDYCYNALNE		 ALAB Plus Sp. z o.o. ALAB weterynaria ul. Stępczaka 22/23, 01-739 Warszawa tel: +48 22 343 68 00 www.alabweterynaria.pl	CW111
Wyniki badań laboratoryjnych			
Pogotowie Weterynaryjne w CTB, ul. Kaspraka 3 Warszawa Wzrostkiel Pajęcz. Kot. Maraton		Komenda zlecenia: 119 / 28-04-2019 Data i godz. rejestracji zlecenia: 23-04-2019 20:14 Data i godz. zlecenia: Data i godz. zlecenia Data wykonania badania: 28-04-2019 Data i godz. wydania: 29-04-2019 14:00	
		Rozszyfrowanie	
Rozpoznanie Przewlekła choroba (infekcja) Ciężka infekcja (sepsis)		Wynik badania Nie stwierdzono Infekcji	
Wynik Wzrostkiel		Znaczenie Infekcja	

28/04/2019 21:23: BADANIE

 ZASTOSOWANE LEKI

HILLS CAN/FEL a/d puszka	1	szt
--------------------------	---	-----

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

28/04/2019 22:58: WIZYTA

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

28/04/2019 22:58: BADANIE

 ZASTOSOWANE LEKI

OBROŻA DLA KOTA SETTLEDOWN	1	SZT.
----------------------------	---	------

Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

29/04/2019 18:51: BADANIE

**OPIS WYWIADU****BADANIE USG:**

- żołądek wypełniony echogenicznym pokarmem, dwunastnica oraz początkowe odcinki jelita cienkiego z widocznym pasażem treści pokarmowej. Większa część jelita cienkiego z widocznym obrzękiem zapalnym błony śluzowej, o poszerzonej średnicy światła (do ok. 1.0-1.3cm), perystaltyka zachowana, brak cech niedrożności. W okrężnicy obecne płynne resztki pokarmowe
- powiększone węzły chłonne krezkowe - średnicy: 0.5-0.6cm, z cechami odczynu zapalnego. W krezce jelita cienkiego widoczny rozlany odczyn zapalny
- lewy płat trzustki szerokości: 0.7-0.8cm, miąższ o umiarkowanie obniżonej echogeniczności, z cechami przebytego zapalenia, bez obrzęku
- wątroba o cechach powiększenia, miąższ o zwiększonej echogeniczności, echostruktura z cechami średniego stopnia stłuszczenia i miejscowej przebudowy pozapalnej, obrys brzegów zaokrąglony. Pęcherzyk żółciowy średnicy: 1.0cm, wypełniony hipoechogenicznym płynem, układ żółciowy nieposzerzony
- uwidoczniono śladową ilość wolnego płynu w środkowej części jamy otrzewnej
- widoczny fragment szyjki macicy średnicy: 0.3-0.4cm, endometrium bez zmian zapalnych, brak cech ropomacicza

**ZABIEGI**

USG 1,2

Materiały <5>



Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

29/04/2019 18:59: BADANIE

**OPIS WYWIADU**

Cos tam zjadła, nie wymiotowała, defekacja ok.

**OPIS BADANIA**

T 38,8C, spojówki różowe, bł. śl. różowe. Brzuch miękki, jelita pogrubiałe. Była odrobaczona po badaniu kału (negatywnym).
Podano leki. Konieczna kontynuacja, jutro problem, na życzenie wydano leki. Ale jeśli coś nie tak wizyta od razu.
Potem jak będzie ok synulox do zmiany na betamox. kotka karmiąca.

**ZABIEGI**

A Wizyta kontynuacja

Materiały <5>

**ZASTOSOWANE LEKI**

SYNULOX INJ. 100 ML	0,25	ml
SYNULOX INJ. 100 ML	0,5	ml
Tolfedine inj	0,3	ml
SOLUTio RINGERI 250 ml	1	szt.
<i>Dawkowanie: 120</i>		
VIT B12 100MCG/ML 1ML * 10 AMP	1	ml
PERITOL 4MG TAB.	2	szt

 Zarejestrowań: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

05/05/2019 21:03: WIZYTA

 ZASTOSOWANE LEKI

DIET CAN/FEL RECOVERY/RENAL/GI/GI HIGH ENERGY LIQUID 1800 ml

 Zarejestrowań: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

05/05/2019 21:10: BADANIE

 OPIS WYWIADU

Wymiotuje, ma biegunkę. Pani dostała tabletki od innego lek.wet. i je kontynuowała a kot wymiotował i miał luźny stolec na przemian z normalnym. Z tego powodu nie chciałam wydawać leku w inj żeby mieć kontrolę, a już zdecydowanie nie kontynuowałabym w tabletkach.

Dziś dostała surową wołowinę i za chwilę zwymiotowała.

Wodę pije(nauczyła isę bo na początku nie było sznas). Od 29.05 jest na mięsie, karmę mokrą i suchą też zaczęła jeść. Polecono nie podawać kotce mleka dla maluchów.

W kwietniu jadła tylko recovery i wszystko było ok. Oczywiście zdarzał się raz na jakiś czas luźniejszy stolec, ale na karmę reagowała dobrze i co najważniejsze chciała ją jeść potem (najpierw dokarmiana).

 OPIS BADANIA

T 38,7C< spojówki różowe, bł śl różowe, brzuch miękki, lekko tkliwy, jelia tegie, tręć płynna i gazy. Kał wodnisty jasnobrązowy. A test na koronawirusa ujemny. Badania na pasożyty ujemne, ale wg mnie ma pasożyty, choć przyczyna stanu jest bardziej złożona.

Czekamy na wyniki posiewu, ale konieczne odrobaczenie jak tylko się polepszy.

Nifuroksazyd 3x 1 0,5ml, probiotyk koniecznie.

Jutro kontrola i kontynuacja, ew dodatkowe zalecenia jeśli brak poprawy.

zmiana natybiotyku

 ZABIEGI

Terapia optymalna

A Wizyta kontynuacja

Materiały <5>

LEKI DODATKOWE

sol ringeri 100

 ZASTOSOWANE LEKI

Biotyl 50	0,6	ml	
No-Spa	0,5	ml	
ATROPINUM SULFUR.0.5MG/1ML INJ.10SZT.	0,1	ml	
Tolfedine inj	0,3	ml	
NIFUROKSAZYD zawiesina	6	ml	
SOLVERTYL 25 mg/2ml ampułki	0,3	ml	
VIT B12 500MCG/ML 2ML * 5 AMP	0,5	ml	
PREVOMAX 10MG/ML 20ML	0,3	ml	

 Zarejestrowała: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

06/05/2019 16:28: BADANIE

OPIS BADANIA

Wg właścicielki jest poprawa w stosunku do dnia wczorajszego.
Świadomość zachowana, prawidłowa.
Reakcja na bodźce zachowana, prawidłowa.
Postawa ciała zmienna, prawidłowa.
Błony śluzowe jasnorożowe, średnio wilgotne. CRT poniżej 2s.
Osluchowo b/z.
Brzuch lekko napięty, minimalnie tkliwy.
Temperatura ciała: 38,5st.C
Dzisiaj jeden wymiot.
Podano leki (kontynuacja) oraz kroplówkę S.C.
Zalecono wizytę kontrolną jutro.

ZABIEGI

A Wizyta kontynuacja
Materiały <5>

ZASTOSOWANE LEKI

NaCl 100ml	1	szt.
WLEWNIK	1	szt
Duphalyte	20	ml
Biotyl 50	0,6	ml
Tolfedine inj	0,3	ml
SOLVERTYL 25 mg/2ml ampułki	0,2	ml
No-Spa	0,3	ml
PREVOMAX 10MG/ML 20ML	0,3	ml

 Zarejestrowała: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

07/05/2019 19:16: BADANIE

OPIS WYWIADU

wczoraj i dzis wymioty i biegunka dzis pogorszenie w stosunku do wczoraj. dzis trudnosci z oddychaniem

OPIS BADANIA

kot osowialy apatyczny, bardzo oslabiony, sierśc matowa, wciąż karmi kociaki.
bl śluzowe jasno rozowe lepkie, spojówki lepkie, ładki oczne zapadnięcie, fałd skóry nieelastyczny 5-6 s, ww chłonne
nie powiększone, osłuchowo b/z, brak cech duszności, okolica odbytu zabrudzona kałem biegunkowym.
zalecenie odstawienia kociat i osuszenie gruczołów mlekowych. narazie właściciel nie wyraża zgody

hospitalizacja min 3 dni

ZABIEGI

WIZYTA DOMOWA<150>
DOJAZD - BLISKI (do 5 km)

 Zarejestrowała: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

07/05/2019 19:20: BADANIE

Temperatura: 38,8°C

** OPIS BADANIA**

leży na boku osłabiona reakcja na bodźce, jeżeli nic nie zje w nocy proszę o dokarmienie convalescence

** ZABIEGI**

SZPITAL KOT DOBA <55>
ZAŁOŻENIE VENFLONU

** ZASTOSOWANE LEKI**

VENFLON 0.8 (niebieski)	1	szt
NaCl 100ml	1	szt.
Duphalyte	1	ml
DIET FEL FIBRE 400g	1	op
<i>brak apetytu</i>		
FORTIFLORA CAT	1	sasz
DIA DOG'N CAT	1	tab
Metronidazol 0.5% 100ml	10	ml
<i>Dawkowanie: 20 mg 2x dziennie iv min 7 dni</i>		
Dexasone	0,2	ml
<i>Dawkowanie: 0,15 mg/kg sc</i>		
Biotyl 50	0,5	ml
<i>Dawkowanie: sc</i>		
VIT B12 500MCG/ML 2ML * 5 AMP	0,5	ml
SOLVERTYL 25 mg/2ml ampulki	0,2	ml

 Zarejestrowała: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

07/05/2019 19:25: BADANIE** OPIS BADANIA**

narazie bez posiewu kału, sugeruje odczekac min 3 dni i wykonać jeśli będzie brak poprawy, w obrazie usg stan zapalny jelit

 Zarejestrowała: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

07/05/2019 22:16: BADANIE** OPIS WYWIADU**

- usg jama brzuszna pełne
- jeżeli po 3 dniach biotyłu nie ma poprawy konieczna zmiana cefalosporyna + metronidazol (bo jak karmi to nie można enrobiofloxy)
- posiew kału na cito
- bad kliniczne, monitoring
- antybiotyk, przeciwzapalne
- dokarmianie

 Zarejestrowała: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

08/05/2019 00:21: BADANIE

 OPIS BADANIA

Pani prosi o stosowanie się do jej zaleceń, tj.

- utrzymywanie laktacji, co jakiś czas wyciskanie mleka z gruczołów
- podkarmianie kotki
- pani prosi o USG (jest wpis MMi że w USG stan zapalny jelit, myślałam, że było zrobione i tak poinformowałam panią)
- ustalono podawanie Zylkene
- IPP/solvertyl
- kontynuacja metronidazolu
- pobrano wymaz z prostrnicy

Kotka podczas dokarmiania zdenerowała się, nie dała się zważyć. Zakończono płynoterapię, kolejna porcja rano. Podkarmiono ok. 30 ml karmy dla kociąt (duża zawartość wapnia) z dodatkiem helcidu, bioprotectu i zylkene. Samopoczucie dobre, kotka aktywna, zaczepia, brzuch miękki, jelita lekko zgazowane i rozpulchnione. Bez biegunki. Osluchowo bez zmian. Sierść matowa. Temp. 38,2 st. C
Odcisnięto mleko z gruczołów mlekowych.

 ZABIEGI

LAB WET Wymaz <90>
POBRANIE WYMAZU

 ZASTOSOWANE LEKI

Zylkene 75 mg tabl	1	listek
ROY CAT PEDIATRIC 195g puszka	1	op
HELICID 20MG * 28 KAPS	1	szt

 ZALECENIA

- kroplówka z dufalyte jutro rano

 Zarejestrowała: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

08/05/2019 08:02: BADANIE

 OPIS BADANIA

Podkarmiono jeszcze o 3.00, sama nie je. Samopoczucie ok. podano metronidazol 20 ml. Podłączam płyn z dufalitem (70 ml NaCl:Glu 2:1)

KOTKA SAMA NIE JE ZMISECZKI, TRZEBA DOKARMIAC STRZYKAWKA. Odbiór dziś o 19.00. Pani jest lekarzem, myślę, że jedna dawka metronidazolu może podawać sama w domu.

Zalecenia:

- pełne USG
- leki osłonowe (omeprazol, solvetyk)
- przy bieguncie smecta

ZASTOSOWANE LEKI

Historia wizyt

Metronidazol 0.5% amp.20 ml	1	amp
Duphalyte	10	ml

 Zarejestrowa! DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

08/05/2019 13:38: BADANIE

OPIS BADANIA

mikcja +++ defekacja-
bł śluzowe blado różowe, stan zapalny przyzębia, crt ok 2s, lepkawe
brzuch napięty, bolesny
znaczny ślinotok, póki co bez wymiotów; ze wzgl na działanie p/ bólowe również pdoano prevomax

w związku z brakiem dostatecznej reakcji na biotyl- shotapen

ZASTOSOWANE LEKI

Shotapen	0,3	ml
----------	-----	----

ZALECENIA

- krew przed wydaniem
- usg miało być dzisiaj?
- wieczorem zylkene

 Zarejestrowa! DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

08/05/2019 17:48: BADANIE

OPIS BADANIA

+AGa+JP
podczas próby badania przyspieszone oddechy i wzmożona walka, odpychanie się łapami, panika
język różowy, śluzówki różowe
osłuchano w pozycji na boku- pojawiły się rżenia drobnobańkowe w fazie wdechu, bez patologicznych dźwięków nad GDO
podano furosemid 2mg/kg, podłączono tlen

odstępujemy od badania krwi i usg z racji wysokiego ryzyka

ZABIEGI

TLENOTERAPIA 2

ZASTOSOWANE LEKI

FUROSEMIDUM INJ.(50 AMP.)	0,56	ml
---------------------------	------	----

 Zarejestrowa! DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

08/05/2019 18:15: BADANIE

OPIS BADANIA

duszność cały czas utrzymuje się, podano kolejną dawkę furosemidu, trwa tlenoterapia, klatka okryta osłoną

godz. 18.45

jedynie nieznaczna poprawa, wskazane badanie RTG kontrolne klatki piersiowej, ale obecnie zbyt duże ryzyko zejścia,

zintensyfikowano tlenoterapię, minimalizujemy stres, podano niską dawkę butomidoru celem uspokojenia

ZASTOSOWANE LEKI

FUROSEMIDUM INJ.(50 AMP.)	0,56	ml
Butomidor 10ml	0,05	ml

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

08/05/2019 19:40: BADANIE

OPIS BADANIA

nagle doszło do znacznego pogorszenia duszności, i po chwili wysztynienia głowy i szyi

natychmiast przystąpiono do reanimacji, zaintubowano i prowadzono sztuczną wentylację z użyciem tlenu, w rurce intubacyjnej śladowe ilości ciemnobrązowej piany, wymieniono na nową i dalej prowadzono sztuczną wentylację po chwili stwierdzono zanik akcji serca - łącznie przez 3 cykle reanimacyjne podano adrenalinę, atropinę, corhydron i furosemid.

Nie udało się przywrócić funkcji życiowych.

Ciało pozostawiono do kremacji zbiorowej.

AGa poinformowała o zgonie kotki

ZABIEGI

zwłoki(kot, mały pies) 3

ZASTOSOWANE LEKI

Corhydron 100mg	1	amp
Adrenalina inj. 1mg/ml inj	1	ml
ATROPINUM SULFUR.0.5MG/1ML INJ.10SZT.	1	ml
FUROSEMIDUM INJ.(50 AMP.)	1	ml

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

08/05/2019 21:11: BADANIE

OPIS BADANIA

pośmiertnie JW wykonał echo i usg j.brzuszej,
następnie wykonano skróconą sekcję zwłok

w klatce piersiowej ok 250ml brunatnoczerwonego płynu, sylwetka serca bez zmian, płuca obkurczone bez guzków/włókniaka/zmian zapalnych

żołądek przepełniony płynną treścią, dwunastnica zgrubiała i twarda, z zewnątrz błona surowicza z wybroczynami - po przecięciu ściany uwidoczniło się odlew twardego skrzepu czopującego światło dwunastnicy, śluzówka zgrubiała silnie pofałdowana, trzustka niezmienniona, w pozostałych częściach jelit kał mazisty czarnoczerwony, nerki niezmiennione, śledziona niezmienniona

pośmiertnie pobrano płyn z klatki piersiowej (bad.og.+cytologia) oraz wymaz ze śluzówki dwunastnicy do probówki z podłożem i do suchej probówki, a także wykonano test FPV - ujemny

ZABIEGI

WYKONANIE TESTU DIAGNOSTYCZNEGO

FPV

LAB WET Wymaz <90>

POBRANIE WYMAZU

WYKONANIE TESTU DIAGNOSTYCZNEGO 2

skrótowa sekcja

LAB WET Płyn z jamy ciała badanie ogólne

LAB WET cytologia <75>

ZASTOSOWANE LEKI

TEST FPV - PANLEUKOPENIA 1 szt

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Podpis lekarza weterynarii