



**Okulistyczna Przychodnia
Weterynaryjna Garncarz Jacek**
ul. Grupy AK "Północ" 2 lok. U 10
00-713 Warszawa
Telefon: 22-858-8062

Zwierzę

Tofik

Gatunek: Pies
Rasa: Mieszaniec
Płeć: samiec
Wiek: 5 lat i 1 miesiąc
Oznakowanie:
Maść: czarna podpalana

Właściciel

Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt "Viva"

ul. Kawęczyńska 16 Lok. 39
03-772 Warszawa
Telefon: 739 92 27
Lekarz prowadzący: OKUL. PRZYCH. WET. REJESTRACJA

Karta informacyjna wizyty

06/10/2016 12:36: Badanie

Opis badania:

Badanie Kliniczne przed znieczuleniem:
węzły chłonne dostępne do badania klinicznego bez wyczuwalnych zmian,
błony śluzowe jamy ustnej różowe, tętno dobrze wyczuwalne, 103/min
CWK 1,5 sec, osłuchowo brak patologicznych szmerów płuc, fizjologiczny szmer pęcherzykowy,
osłuchiwanie serca: rytm miarowy, wyraźnie słyszalne 2 tony serca, brak patologicznych szmerów sercowych

ASA 1

Po premedykacji:

dobry efekt sedacji miorelaksacji i analgezji uzyskano po 10 min
założono venflo, podano NaCl 500ml IV

Po indukcji:

tętno: 84/min oddechy: 15/min saturacja: 100%
błony śluzowe jamy ustnej: różowe

Znieczulenie ogólne: wziewne

śr tętno 70 - 80/min

śr saturacja 100%

śr liczba oddechów/min 15/min

temp w trakcie operacji: 38,2 C

EKG w trakcie operacji: normogram, prawidłowa morfologia załamków P, QRS, T

stan ogólny: dobry

Analgezja śródoperacyjna: butorfanol

Analgezja pooperacyjna: melovem 1 inj Sc

Inne leki po operacyjne:

DLA WŁAŚCICIELA:

Zalecenia pooperacyjne:

1. Po operacji zwierzę powinno być trzymane w cichym, ciepłym i bezpiecznym miejscu. Należy mu zapewnić spokój.
2. Proszę podać jedzenie dopiero od jutra
3. Picie można podać od godziny 18:00;
4. Terapia bólu pooperacyjnego:
melovem - od jutra około 13:00 proszę podawać 1xdziennie do pyszczka zawartość 1 strzykawki przez 4 kolejne dni
5. Terapia wspomagająca:

- a) bioprotect
- b) bioprazol/ranigast
- c) hepatale forte
- d) siemie lniane od jutra 1 łyżeczkę zalać 3/4 szklanki gorącej wody i zamieszać. Odstawić na kilka minut, często mieszając do uzyskania śluzowatej konsystencji. Podawać 1x dziennie 1/4 szklanki do karmy lub na pół godziny przed posiłkiem

Inne zalecenia/dodatkowe leki.....

.....
.....
.....

Zabiegi

Znieczulenie ogólne II 0,5

Zastosowane leki

CEPETOR / 10 ML INJ 0,2 0,1 ml

BUTOMIDOR INJ 10 ML 0,3 ml

Venflon 1,0 (różowy) 1 szt

SCANOFOL 10 MG / ML FIOL.20 ML 5 ml

Materiały do narkozy wziewnej 1 1 szt

NaCl 0,9% 500 ml 1 szt

MELOVEM 5 MG/ML 100 ML 1,1 ml

Zarejestrował: Dr n wet. Agnieszka Wrzesińska

Podpis lekarza weterynarii