



Klinika Weterynaryjna REDLINE
leczenie i rehabilitacja zwierząt
ul.Łączności 2G
05-552 Wólka Kosowska, Łazy
Telefon: (022) 757-77-74, 0 607-279-969

Zwierzę

Pestka

Gatunek: Pies
Rasa: Mieszaniec
Płeć: samica
Wiek: tygodni: 13
Oznakowanie:
Maść:

Właściciel

Fundacja VIVA! - AKCJA ZAGINĄŁ DOM

ul.Kawęczyńska 16/42A
00-367 Warszawa
Telefon: 506-357-299
Lekarz prowadzący: Magdalena Zawilińska-Pankiewicz

Historia wizyt

05/10/2017 20:41: Badanie i diagnostyka

Opis badania:

Od 3 dni leczony na parwowirozę potwierdzoną testem CPV.
Nadal biegunka z krwią, wymioty, Dostała Caniglob, płyny, Biovetalgin, vetaflunix, cerenię, diphalyte 20 ml,
antybiotyki to synergal z enrofloksacyną, cerenię.
Wykonano badanie morfologiczne krwi 3.10.2017.
Podano surowicę od ozdrowieńca.

Ze względu na wiek psa zalecenie zmiany antybiotyku na synergal z metronidazolem (enrofloksacyna może zaburzać funkcjonowanie chrząstki wzrosowej), zalecam odstawienie NLPZ, do decyzji lekarza jutro.

W opisie morfologia z 3.10.2017
Wykonano badania diagnostyczne.
Kwota: 0,00
Zarejestrował: Anna Andrzejewska

Morfologia krwi

Parametr	Wartość	J.m.	Min	Max	
Erytrocyty	6,22 T/l	(=)	5,5	8,5	OK
Hemoglobina	130 g/dl	(=)	12	18	+
Hematokryt	41,5 %	(=)	39	56	OK
MCV (ŚOK)	66,8 fl	(=)	62	72	OK
MCH (ŚMH)	20,9 pg	(=)	20	25	OK
MCHC	313 g/dl	(=)	32	36	+
RDW%	14,6 %	(=)			
Leukocyty	9 G/l	(=)	6	16,5	OK
Limfocyty	1,5 G/l	(=)	0,8	5,1	OK
Monocyty	0,2 x10 ⁹ /l	(=)	0	1,8	OK
Granulocyty	7,3 G/l	(=)	4	12,6	OK
Limfocyty %	16,6 %	(=)	12	30	OK
Monocyty %	2,8 %	(=)			
Grans% (% Granulocytów)	80,6 %	(=)	60	83	OK
Eozynofile	5,4 %	(=)	2	10	OK
Trombocyty	160 G/l	(=)	117	460	OK
MPV	10,1 fL	(=)	7	12,9	OK
PDW	16,3 %	(=)			
PCT	0,161 %	(=)			

06/10/2017 11:51: Badanie

Temperatura: 38,2°C

Opis badania:

pojedyncze wymioty rano
rozluźniony kał
przez większość część dnia leży

Zabiegi

F DOBA HOTELOWA/SZPITALNA PIES DO 15 KG

F KROPLÓWKA

ORDYNACJA DUŻA

canglob 1,8 ml

Zastosowane leki

Aparat typ S do przetaczania płynów z ł. 1 szt.

NaCl 0,9% 250 ml 200 ml

Duphalyte 500ml 50 ml

Solveryl 25mg/ml 0,2 ml

Cerenia inj 20 ml 0,44 ml

Metronidazol 0,5%; 100 ml 18 ml

Dawkowanie: 9 ml 2 x dz

Synergol 100ml 0,22 ml

No-Spa inj. 0,4 ml

Papaverinum amp 0,4 ml

Bioprotekt pasta 15 ml. 1 szt.

Strzykawka 2 ml 5 szt.

Strzykawka 20ml 1 szt.

Igły 0,7 x 40 6 szt.

Podkład 60x90 4 szt.

Kwota: 178,00

Zarejestrował: Anna Szarzyńska- Butkiewicz

07/10/2017 09:34: Badanie

Temperatura: 38,2°C

Opis badania:

karmiona na siłę strzykawką, zainteresowana jedzeniem, ale nie pobiera sama pokarmu
kał rozluźniony
pojedyncze wymioty wieczorem
brzuch napięty
przez większość część dni śpi

Zabiegi

F DOBA HOTELOWA/SZPITALNA PIES DO 15 KG

F KROPLÓWKA

ORDYNACJA DUŻA

canglob 1,8 ml

Zastosowane leki

Aparat typ S do przetaczania płynów z ł. 1 szt.

NaCl 0,9% 250 ml 200 ml

Duphalyte 500ml 50 ml

Solveryl 25mg/ml 0,2 ml

Cerenia inj 20 ml 0,44 ml

Metronidazol 0,5%; 100 ml 18 ml

Dawkowanie: 9 ml 2 x dz

Synergol 100ml 0,22 ml

No-Spa inj. 0,4 ml

Papaverinum amp 0,4 ml

Strzykawka 2 ml 5 szt.

Strzykawka 20ml 1 szt.

Igły 0,7 x 40 6 szt.

Podkład 60x90 4 szt.

Aptus Attapectin 30 tabl 3 tabl

R.C. cat/dog Recovery 195g puszcza 1 szt.

Kwota: 156,00

Zarejestrował: Anna Szarzyńska- Butkiewicz

08/10/2017 09:10: Badanie

Opis badania:

po nocy biegunka- kał mocno rozluźniony, przez większość część dnia brak kału, pod koniec dnia rozluźniony kał
brzuch napięty

brak wymiotów

przez większość część dnia śpi

Zabiegi

F DOBA HOTELOWA/SZPITALNA PIES DO 15 KG

F KROPLÓWKA

ORDYNACJA DUŻA

canglob 1,8 ml

Zastosowane leki

Aparat typ S do przetaczania płynów z ł. 1 szt.

NaCl 0,9% 250 ml 200 ml

Duphalyte 500ml 50 ml

Solvertyl 25mg/ml 0,2 ml

Metronidazol 0,5%; 100 ml 18 ml

Dawkowanie: 9 ml 2 x dz

Synergol 100ml 0,22 ml

No-Spa inj. 0,4 ml

Papaverinum amp 0,4 ml

Strzykawka 2 ml 3 szt.

Strzykawka 20ml 3 szt.

Igły 0,7 x 40 6 szt.

Podkład 60x90 4 szt.

Aptus Attapectin 30 tabl 6 tabl

Dawkowanie: 3 tabl 2 x dz

Kwota: 147,00

Zarejestrował: Anna Szarzyńska- Butkiewicz

09/10/2017 12:08: Badanie

Temperatura: 38,3°C

Opis badania:

nadal rozluźniony kał, brak wymiotów

brzuch lekko napięty

niechętnie pobiera pokarm, trzeba ją karmić

Zabiegi

F DOBA HOTELOWA/SZPITALNA PIES DO 15 KG

F KROPLÓWKA

ORDYNACJA DUŻA

canglob 1,8 ml

Zastosowane leki

Aparat typ S do przetaczania płynów z ł. 1 szt.

NaCl 0,9% 250 ml 200 ml

Duphalyte 500ml 50 ml

Solvertyl 25mg/ml 0,2 ml

Metronidazol 0,5%; 100 ml 18 ml

Dawkowanie: 9 ml 2 x dz

Synergol 100ml 0,22 ml

No-Spa inj. 0,4 ml

Papaverinum amp 0,4 ml

Strzykawka 2 ml 3 szt.

Strzykawka 20ml 3 szt.

Igły 0,7 x 40 6 szt.

Podkład 60x90 4 szt.

Aptus Attapectin 30 tabl 6 tabl

Dawkowanie: 3 tabl 2 xdz

Kwota: 138,00

Zarejestrował: Anna Szarzyńska- Butkiewicz

Podpis lekarza weterynarii