



## Właściciel

DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Lekarz prowadzący: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

## Zwierzę

### Rossi

Gatunek: pies  
Rasa: Mieszaniec  
Płeć: samiec  
Wiek: 10 lat  
Oznakowanie:  
Maść: czarna

# Historia wizyt

07/04/2019 19:46: BADANIE

## OPIS WYWIADU

W poniedziałek sterylizacja. Nie miała obranka ani kołnierza. Dzisiaj pani zauważyła, że rozeszły się szwy i widać wnętrzności. Rano dostał od swojego lekarza antybiotyk i lek przeciwbólowy, nie wiadomo jakie.

## OPIS BADANIA

Przyjęto pacjenta do gabinetu szpitalnego. Założono wenflon, podano metronidazol, biovetalgin iv, metacam sc. i sol. ringeri. (500ml)

bł. śluzowe jasnoróżowe, lepkie  
HR - 148/min  
C-39,5

Rana wielkości 3-4 cm, przez światło wydostały się jelita, jelita bardzo przekrwione, obrzęknięte, niemożliwe do odprowadzenia.

Jest zgoda na zabieg u PR.

Jelita obficie nawilżono płynem fizjologicznym, założono opatrunek, założono ubranko.

Pobiera opłatę także za pobyt szpitalny do jutra popołudnia

Czekamy na chirurga.

## ZABIEGI

A Wizyta Pierwsza  
Materiały <5>  
OPATRUNEK - ZMIANA  
ZAŁOŻENIE VENFLONU  
Materiały <15>  
SZPITAL DUŻY PIES / OIOM <105>  
Materiały <5>

## ZASTOSOWANE LEKI


Metronidazol 0,5 % 100 ml	2	szt.
Biovetalgin 50% inj 100 ml	3,5	ml
LOXICOM 5MG 100ML inj	1,3	ml
SOLUTio RINGERI 500 ml	1	szt.
WLEWNIK	1	szt
Venflon 1.0 (różowy)	2	szt

Historia wizyt

VET FLEX 5cm	1	szt
NaCl 100ml	2	szt.
UBRANKO POOPERACYJNE XXL	1	SZT

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

**07/04/2019 21:19: BADANIE**

 **OPIS WYWIADU**

dokładny opis jutro rano

 **OPIS BADANIA**

laparotomia i opracowanie przepukliny brzusznej - opis jutro rano  
w jamie brzusznej umieszczono dren do odpływu treści oraz ew. przepłukiwania

zostaje w szpitalu na kolejne minimum 24-48 h

jutro proszę o badanie kontrolne krwi

utro też ma być ustalony jaki pies dostał antybiotyk - proszę wtedy o kontakt w celu ustalenia leków do podania przez nas

pierwsze karmienie i pojenie jutro rano  
leki przeciwbólowe (poltram oraz biovetalgin) do powtórki co 6-8 godzin

 **ZABIEGI**

ZABIEG CHIRURGICZNY ŚR SKOMPL

 **ZASTOSOWANE LEKI**

SERWETA CHIRURGICZNA 75x95	1	szt
RĘKAWICZKI CHIRURGICZNE	2	szt.
NICI DAFILON 1	3	szt
NICI PDX 2/0	1	szt.
Nici PDX 1	3	szt.
NIC Vicryl	6	szt
CEWNIK pies	1	szt

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

**08/04/2019 00:01: BADANIE**

 **OPIS WYWIADU**

Znieczulenie w celu wykonania zabiegu laparotomii.

Premedykacja : Butomidol + Cepetor

Indukcja znieczulenia : Relanium+ propofol+ ketamina

Podtrzymanie znieczulenia : Cepetor + Butomidol + ketamina +propofol

Przebieg znieczulenia prawidłowy . Wybudzenie spontaniczne.

Analgezja pooperacyjna:

Poltram 4mg/kg kolejne podanie o 6:00

Biovetalgin kolejne podanie o 4:00

Metacam co 24 h.

Historia wizyt

Trwa powolna podaż płynów.

**ZABIEGI**

Znieczulenie ogólne I  
Voluven inj 250ml 120

**ZASTOSOWANE LEKI**

Cepetor	0,6	ml		
Butomidol 10ml	0,6	ml		
PROPOFOL 1% 5AMP20ML	15	ml		
Bioketan 10ml, 100mg.ml ketamina	1,5	ml		
Relanium	1	amp		
Sol Ringer lactate 500 ml (płyn ringera z mleczanami)	3		szt.	
Poltram 50	3	ml		
EXACYL 100MG/1ML INJ. 5ML 5SZT./POLFA/	5	ml		

Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

---

**08/04/2019 01:15: BADANIE**

Temperatura: 37,8°C

**OPIS WYWIADU**

Powoli wybudza się, serce miarowe, szmery oddechowe zaostrzone, śluzówki różowe.  
Trwa dogrzewanie i podaż płynów.

Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

---

**08/04/2019 04:27: BADANIE**

Temperatura: 37,7°C

**OPIS BADANIA**

Wokalizuje.  
Trwa dogrzewanie + powolna podaż płynów.

Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

---

**08/04/2019 06:00: BADANIE**

**OPIS BADANIA**

Poltram i.v.  
Biovelgin i.v.

**ZASTOSOWANE LEKI**

Poltram 50	3	ml		
Biovetalgin 50% inj 100 ml	3,5	ml		

Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

**08/04/2019 09:17: BADANIE****OPIS BADANIA**

sunia pomrukująca, wokalizująca raz na jakiś czas, oblizuje się zalega na kocu, nie chce się podnieść, apatyczna

m+++ ? kocyk mokry  
def-

T 37,8  
śluzówki jasnoróżowe, wilgotnawe, crt~1s  
puls ~150/min

na kocu wysięk prawdopodobnie z drenu,  
dren zaciśnięto tuż przy brzuchu kleszczykami, wypłukano metronidazolem, wyciśnięto pozostały płyn, zdjęto kleszczyki i podłączono worek do zbiórki płynu

podłączono pompę i.v. z ketaminą, po ok 15minutach przestała mruczeć  
po ok 30minutach ponownie pomrukiwanie - dołączono więc lidokainę i.v. cri

w poprzedniej lecznicy otrzymała synulox

**ZASTOSOWANE LEKI**

Bioketan 10ml, 100mg.ml ketamina 0,7 ml  
Dawkowanie: 0,18ml LD,  
0,35ml/2h CRI

Metronidazol 0.5% 100ml 100 ml  
LIGNOCAINUM H/CHLOR.2% 20MG/ML 2ML 10SZT 2,5 ml  
Dawkowanie: LD 1ml b.powolnie! w dużym rozcieńczeniu i.v.  
CRI 1,5ml/h (0,7mg/kg/h) niska dawka dodana do ketaminy

Synulox inj 50ml 1,75 ml  
Biovetalgin 50% inj 100 ml 2 ml  
WLEWNIK 1 szt

Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

**08/04/2019 11:15: BADANIE****OPIS BADANIA**

w związku z utrzymywaniem się cichego pomrukiwania podłączono kolejną pompę CRI z fentanylem low-dose 2mcg/kg/h

w związku z zaleganiem, zacewnikowano  
pojawił się zastoinowy bursztynowy mocz ze strąkami

**ZABIEGI**

CEWNIKOWANIE PSA

Materiały <5>

2x worki - jeden na mocz, drugi na płyn z otrzewnej

**ZASTOSOWANE LEKI**

Fentanyl 2.0ml AMP 1 ampułka  
Bioketan 10ml, 100mg.ml ketamina 0,4 ml  
LIGNOCAINUM H/CHLOR.2% 20MG/ML 2ML 10SZT 2,6 ml  
CEWNIK pies 1 szt

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

---

**08/04/2019 12:34: BADANIE**

---

 **OPIS BADANIA**

w worku na mocz 250ml bursztynowego moczu

podłączono nową kroplówkę i.v. z małą dawką furosemidu

na pompie jest poprawa, ale raz na jakiś czas jeszcze pomrukuje, następny wlew CRI z większą dawką fentanylu

 **ZABIEGI**

Materiały <10> 1,5

sandostatin 2mcg/kg

 **ZASTOSOWANE LEKI**

SOLUTio RINGERI 500 ml 1 szt.

WLEWNIK 1 szt

Furosemid 20mg/2ml 2 ml

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

---

**08/04/2019 13:17: BADANIE**

---

 **OPIS BADANIA**

kolejny wlew z lekami p/bólowymi CRI

pompa ustawiona na 4h

wokalizacja nadal obecna, do rozważenia inne leki p/bólowe?

trwa podaż kroplówki Sol.ring.i.v.

w wężyku pojawił się jasnożółty mocz

 **ZASTOSOWANE LEKI**

Fentanyl 2.0ml AMP 2 ampułka

LIGNOCAINUM H/CHLOR.2% 20MG/ML 2ML 10SZT 5,2 ml

Bioketan 10ml, 100mg.ml ketamina 0,7 ml

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

---

**08/04/2019 14:33: BADANIE**

---

 **OPIS BADANIA**

Trwa podaż leków w CRI.

Wokalizacja zmniejszyła się, pies uspokoił się.

Źrenice zwężone, reaktywność na światło znikoma.

Błony śluzowe różowe, wilgotne.

CRT poniżej 2s.

Osluchowo ok, brak patologicznych szmerów nad płucami.

Rana z obecnym wysiękiem (z okolicy drenu).

Temperatura ciała: 37,9st.C

Podano Solvertyl

Historia wizyt

 **ZASTOSOWANE LEKI**

SOLVERTYL 25 mg/2ml ampułki 6 ml

 Zarejestrował: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

---

Podpis lekarza weterynarii