



**Przychodnia Weterynaryjna Pankracy**  
**Karol Chłopecki**  
ul. Maratońska 1/1  
26-600 Radom  
Telefon: 48 331 52 76



Edited with the trial version of  
Foxit Advanced PDF Editor  
To remove this notice, visit:  
[www.foxitsoftware.com/shopping](http://www.foxitsoftware.com/shopping)

## Zwierzę

**Simon Nr: 011700245**

Gatunek: pies

Rasa: Mieszaniec

Płeć: samiec

Wiek: 1 rok i 1 miesiąc

Oznakowanie:

Maść:

## Właściciel

DO WIADOMOŚCI  
FUNDACJI

# Historia wizyt

## 02/02/2017 11:51: Badanie

Opis wywiadu: pies potrącony przez samochód w ciągu ostatnich 40 min.

w badaniu RTG zwłochnienie kregostupa, ciągłość przepony zachowana, brak wolnego płynu w jamach ciała.

czucie głębokie w KM zachowane, ogon wiotki

### Zabiegi

[Badanie RTG pierwsze](#)

[Badanie RTG kolejne](#)

### Zastosowane leki

Materiały 1 0,15 szt.

Biovetalgin 2 ml

RAPIDEXON 2MG/ML INJ 1 ml

Zarejestrował: lek.wet. Barbara Firlej

## 02/02/2017 23:27: Badanie

Opis wywiadu: hospitalizacja: pies leży, kupa twarda, czucie głębokie w k. miednicznych zachowane, cewnikowany

### Zabiegi

[Szpital-doba](#)

### Zastosowane leki

Materiały 1 0,15 szt.

*Dawkowanie: w tym bunondol 1,4 ml*

Ceporex 2 ml

Dexaven 8 mg/2ml 5 amp.

SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2ML 2 amp.

Biovetalgin 4 ml

PWE 500 ml

NaCl 250 ml

TRAMAL 100MG/2ML INJ. 5SZT. 1 amp

Zarejestrował: lek.wet. Aleksandra Krawczyk

## 03/02/2017 13:25: -

### Zabiegi

[Recepta](#)

*xanax 1 mg 1 op.*

### Zastosowane leki

Materiały 1 0,35 szt.

xanax 1 mg

Zarejestrował: lek.wet. Barbara Firlej

## 04/02/2017 03:54: Badanie

Opis wywiadu: hospitalizacja

### Opis badania:

apetyt zachowany, pije wodę, w ciągu dnia pęcherz wyciśnięty- duża ilość żółtego moczu, wieczorem sam oddał mocz, pies w klatce niespokojny, brak czucia głębokiego w km oraz ogonie

w nocy zabieg ponownej stabilizacji kręgosłupa przeprowadzony przez dr Chłopeckiego ze wzg na nadpobudliwość psa decyzja o śpiączce farmakologicznej po zabiegu

### Zabiegi

Szpital-doba

### Zastosowane leki

Materiały1 0,1 szt.

Materiały1 0,1 szt.

*Dawkowanie: bunondol 1,4ml 2xdz*

Ceporex 2 ml

DEXAVEN 4MG/1ML INJ. 10SZT. 5 amp

Biovetalgin 4 ml

*Dawkowanie: 2ml 2xdz*

NaCl 500 ml

PROPOFOL LIPURO 1% EMULS.DO WST.5AMP20ML 9,5 ml

Materiały1 0,22 szt.

*Dawkowanie: propofol 6,5ml*

MORPHASOL 10 MG/ML / 20ML 0,4 ml

CEPETOR / 10 ML INJ 0,4 ml

SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2ML 2 amp.

*Dawkowanie: 1amp 2xdz*

### Recepty:

Zarejestrował: lek. wet. Ewa Kamola

## 05/02/2017 00:17: Badanie

Opis wywiadu: pies zacewnikowany, nie wstaje, zjadł, brak czucia głębokiego w konczynach miednicznych, odruch zwieracza odbytu prawidłowy.

### Zabiegi

Szpital-doba

### Zastosowane leki

SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2ML 1 amp.

Biovetalgin 2 ml

Dexaven 8 mg/2ml 2,5 amp.

SCANOFOL 10 MG / ML FIOL.20 ML 4 ml

SCANOFOL 10 MG / ML FIOL.20 ML 4 ml

CEPETOR / 10 ML INJ 2 ml

Dexaven 8 mg/2ml 2,5 amp.

SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2ML 1 amp.

Biovetalgin 2 ml

CEPETOR / 10 ML INJ 0,3 ml

MORPHASOL 10 MG/ML / 20ML 0,3 ml

SCANOFOL 10 MG / ML FIOL.20 ML 4 ml

NaCl 500 ml

Materiały1 0,1 szt.

TRAMAL 100MG/2ML INJ. 5SZT. 1 amp

Zarejestrował: lek. wet. Marta Chojnacka

## 06/02/2017 04:21: Badanie

### Opis badania:

nie załatwia się samodzielnie - zacewnikowany, prostata opróżniona z kału  
czucie w kończynach i ogonie obecne, odruch odbytowy obecny

upuszczony gęsty, krwisty płyn z ropnia, podany do środka metronidazol

Diagnoza: kontynuacja

### Zabiegi

Wizyta kolejna

### Zastosowane leki

Metronidazol inj. 0,5 % 120 ml

*Dawkowanie: 60ml 2xdz*

Dexaven 8 mg/2ml 7,5 amp.

*Dawkowanie: 2,5amp co 8 godz*

SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2ML 2 amp.

*Dawkowanie: 1amp 2xdz*

Biovetalgin 4 ml

*Dawkowanie: 2ml 2xdz*

Solutio Ringeri 1000 ml

GENTAMYCYNA 5 % INJ. /50 ML/ 2 ml

Materiały1 0,13 szt.

Zarejestrował: lek. wet. Magdalena Bednarska

## 06/02/2017 15:33: Badanie

Opis wywiadu: 31 stycznia 2017 została wystawiona faktura na kwotę 866,65 zł SB termin płatności 13/02/2017 (mg)

Osoba rejestrująca wizytę: Marta Gołąb

## 06/02/2017 22:43: Badanie

Opis wywiadu: pies zacewnikowany, produkuje duże ilości żółtego moczu, stolec zwarty, oddał bez problemu. napił się wody.

krw na termometrze

czucie głębokie KM obecne , w ogonie obecne.

obrzek jąder.

Dwukrotnie przepłukany ropień okolicy rany

### Zabiegi

Szpital-doba

### Zastosowane leki

Materiały1 0,1 szt.

Dexaven 8 mg/2ml 2,5 amp.

PWE 500 ml

SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2ML 1 amp.

Biovetalgin 2 ml

Gentamicin 0.3 % vet 2 szt.

ENCORTOLON 5MG TAB.20SZT 4 szt

Metronidazol inj. 0,5 % 120 ml

*Dawkowanie: 60*

Zarejestrował: lek.wet. Barbara Firlej

## 08/02/2017 01:13: Badanie

### Opis badania:

Rano zjadł, stolec zwarty. Pił wodę.

W ciągu dnia opróżniono 2 worki moczu.

Rana wypłukana w ciągu dnia metronidazolem a wieczorem r-rem vagothylu.

Prostuje kk. miedniczne, zabiera łapy, merda ogonem. Obrzęk ciastowaty jąder.

Temp między 39,9 a 38,8

## Zabiegi

[Szpital-doba](#)

### Zastosowane leki

SEDATOR / FIOŁKA 10ML 0,4 ml  
MORPHASOL 10 MG/ML / 20ML 0,4 ml  
Metronidazol inj. 0,5 % 120 ml  
SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2ML 2 amp.  
Biovetalgin 4 ml  
NaCl 500 ml  
GENTAMYCYNA 5 % INJ. /50 ML/ 2 ml  
Materiały1 0,1 szt.

Zarejestrował: lek. wet. Dominika Szatkowska

## 08/02/2017 23:30: Badanie

Opis wywiadu: zabieg z dn 3.02 stabilizacja zwichniętego kregostupa

### Opis badania:

podsumowanie 2 zabiegów

stabilizacja L1-2 z użyciem płyty przymocowanej do wyrostków kolczystych,  
destabilizacja w wyniku dużej aktywności i porywczosci psa, złamany wyrostek kolczysty Th 13 i L1

ponowna stabilizacja z wykorzystaniem prętów Steinmanna przymocowanych z wykorzystaniem petli drucianych  
przeprowadzonych przez wyrostki kolczyste i stawowe,

Diagnoza: zabieg stabilizacji kręgosłupa

### Zabiegi

[Zabieg operacyjny 2 2,5](#)

### Zastosowane leki

CEPETOR / 10 ML INJ 1 ml  
MORPHASOL 10 MG/ML / 20ML 1 ml  
VETAKETAM 50 ML 1 ml  
Materiały1 1 szt.  
ISO-VET ml 10 ml  
OMNIPAQUE 350 INJ JODU 50ML 1SZT 10 ml

Zarejestrował: lek. wet. Karol Chłopecki

## 09/02/2017 02:13: Badanie

Opis wywiadu: hospitalizacja

### Opis badania:

temp w granicach 38,4-38,4

zacewnikowany-produkuje dużą ilość żółtego moczu

kał prawidłowy

apetyt zachowany

rana nakłuta——wypływ ropno-krwisty, rana przepłukana rozcieńczonym r-rem vagothylu

czucie głębokie w kończynach miednicznych zachowane

wg rozpiski podany encorton 20mg 2xdz

### Zabiegi

[Szpital-doba](#)

### Zastosowane leki

Materiały1 0,1 szt.  
METRONIDAZOL 250MG TAB. 20SZT. 1,25 tabl.  
Metronidazol inj. 0,5 % 60 ml  
SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2ML 2 amp.

*Dawkowanie: po 1amp*

Biovetalgin 4 ml

*Dawkowanie: po 2 ml*

Solutio Ringeri 500 ml

GENTAMYCYNA 5 % INJ. /50 ML/ 4 ml

Zarejestrował: lek. wet. Ewa Kamola

## 10/02/2017 01:02: Badanie

Opis wywiadu: pies produkuje mocz prawidłowo, nawet oddał sam mocz po rozcewnikowaniu, ma apetyt, czucie głębokie w konczynach zachowane,

### Zabiegi

Wizyta kolejna

### Zastosowane leki

Materiały 1 0,1 szt.

CEPETOR / 10 ML INJ 0,2 ml

MORPHASOL 10 MG/ML / 20ML 0,2 ml

METRONIDAZOL 250MG TAB. 20SZT. 2 tabl.

SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2ML 2 amp.

Solutio Ringeri 500 ml

Zarejestrował: lek. wet. Marta Chojnacka

## 10/02/2017 22:09: Badanie

Opis wywiadu: hospitalizacja: rana operacyjna przeplukana, wysiek słabo krwisty, bolesność okolicy, zaczął sikac/popuszczać, założony pampers

### Zabiegi

Szpital-doba

### Zastosowane leki

Materiały 1 0,1 szt.

METRONIDAZOL 250MG TAB. 20SZT. 2 tabl.

POLPRAZOL 20MG KAPS. 28SZT 1 szt

SEDATOR / FIOŁKA 10ML 0,1 ml

MORPHASOL 10 MG/ML / 20ML 0,1 ml

GENTAMYCYNA 5 % INJ. /50 ML/ 4 ml

NaCl 500 ml

Materiały 1 0,06 szt.

*Dawkowanie: encorton 20 gm –2 tabl*

Zarejestrował: lek.wet. Aleksandra Krawczyk

## 11/02/2017 23:10: Badanie

### Opis badania:

stan bez zmian

Diagnoza: kontynuacja

### Zabiegi

Wizyta kolejna

### Zastosowane leki

Materiały 1 0,1 szt.

METRONIDAZOL 250MG TAB. 20SZT. 2 tabl.

MORPHASOL 10 MG/ML / 20ML 0,2 ml

GENTAMYCYNA 5 % INJ. /50 ML/ 4 ml

NaCl 500 ml

Materiały 1 0,06 szt.

*Dawkowanie: encorton 20 gm –2 tabl*

SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2ML 2 amp.

*Dawkowanie: 1 amp 2xdz*

CEPETOR / 10 ML INJ 0,2 ml

Zarejestrował: lek. wet. Magdalena Bednarska

## 12/02/2017 23:02: Badanie

### Opis badania:

cd leczenia

Diagnoza: cd

**Zabiegi**

[Wizyta kolejna](#)

**Zastosowane leki**

SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2ML 1 amp.

GENTAMYCYNA 5 % INJ. /50 ML/ 4 ml

Materiały1 0,1 szt.

METRONIDAZOL 250MG TAB. 20SZT. 2 tabl.

Zarejestrował: lek. wet. Karol Chłopecki

**14/02/2017 00:22: Badanie****Opis badania:**

ciąg dalszy leczenia

**Zabiegi**

[Wizyta kolejna](#)

**Zastosowane leki**

Materiały1 0,1 szt.

GENTAMYCYNA 5 % INJ. /50 ML/ 4 ml

SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2ML 1 amp.

METRONIDAZOL 250MG TAB. 20SZT. 2 tabl.

Zarejestrował: lek. wet. Dominika Szatkowska

**14/02/2017 15:42: Badanie****Opis badania:**

1. Keflex kapsułki 500mg - 1 kapsułka co 12 h od dzisiaj przez 7 dni

2. Encorton20mg - 1 tabletko o 22 przez 4 dni, potem 1 tabletko co 48h o 22 przez 4 dni, potem po 1/2 tabletki co 48h przez 4 dni.

3. Ograniczenie ruchu i gorset

4. Kontrola za 6 dni u dr Chłopeckiego (od 13 ma zabiegi)

5.Ranigast 40mg 1-2x dziennie

**Zabiegi**

[Recepta](#)

**Zastosowane leki**

SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2ML 1 amp.

Zarejestrował: lek. wet. Karolina Mrukowicz

**22/02/2017 14:59: Badanie**

Opis wywiadu: wystawiam fakture na Fundacje Viva - na SB ( na dzień dzisiejszy kwota zadłużenia 1452,16zł )

Osoba rejestrująca wizytę: Marta Gołąb

---

Podpis lekarza weterynarii