



Przychodnia Weterynaryjna VIVET

ul. Cicha 12 lok. 56

05-300 Mińsk Mazowiecki

Telefon: 505 421 424

E-mail: przychodnia.vivet@gmail.com

Zwierzę

Sunia

Gatunek: Pies

Rasa: Mieszaniec

Płeć : samica

Wiek: 8 miesięcy

Oznakowanie: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Maść : biszkoptowa

Właściciel

DO WIADOMOŚCI
FUNDACJI VIVA!

Lekarz prowadzący : DO WIADOMOŚCI
FUNDACJI VIVA!

Historia wizyt

03/09/2018 10:59: BADANIE I PROFILAKTYKA

OPIS WYWIADU

sunia przygarnięta, błękała się dłuższy czas

OPIS BADANIA

zaropiała rana ucha lewego oraz palca/palców w lewej kończynie piersiowej ; obustronnie przetrwałę kły mleczne szczęki ; spora bolesność przy omacywaniu okolicy rany
decyzja o opracowaniu jutro wszystkiego w znieczuleniu

OPIS PROFILAKTYKI

Pchły +kleszcze NexGard, NexGard Spectra 3.5-7.5kg

ZABIEGI

Ordynacja leku

Porada G

ZASTOSOWANE LEKI

Melovem 5mg inj.	0,3	ml
Kołnierz 15cm	1	szt
NexGard Spectra 3.5-7.5kg	1	szt.

Lekarz: DO WIADOMOŚCI
FUNDACJI VIVA!

04/09/2018 11:29: BADANIE

Waga: 5,8 kg

OPIS BADANIA

w znieczuleniu ogólnym wykonano:

- ekstrakcję obustronnie przetrwałych kłów mlecznych szczęki C504, C604 - usunięte w całości
- toaletę rany brzegu małżowiny usznej lewej
- toaletę rany palca IV kończyny piersiowej lewej - stan po urazie: brak pazura, rozerwana opuszka, widoczny fragment kości paliczka - usunięty wolny fragment kości oraz opuszka palca, ranę oczyszczono , brzegi rany odświeżono i zespolono 3 szwami węzełkowymi Nylon 2-0, pozostawiono apertury do ewentualnego płukania

przebieg znieczulenia i zabiegów prawidłowy

ZABIEGI

Usunięcie przetrwałych kłów mlecz
Założenie venflonu
Kroplówka stand.
Opracowanie rany
Opatrunek 3 6
Materiały 20 2,5
LincoSpectin 6ml (10x0,6ml)
czipowanie

ZASTOSOWANE LEKI

Płyn Ringera 250ml	1	szt.
Melovem 5mg inj.	1,5	ml
Dexdomitor 0,5mg/ml	0,5	ml
Bioketan 10ml inj.	0,5	ml
Butomidol inj. 10ml	0,5	ml
Mikroczip Mini Geulincx	1	szt

ZALECENIA

1. zwierzę po zabiegu powinno wypoczywać w cichym i ciepłym miejscu
2. wodę do picia podajemy min. 6h po zabiegu, pokarm - dnia następnego
3. przez 2-4 doby po zabiegu zwierzę może odczuwać dyskomfort przy gryzieniu i żuciu pokarmu - proszę podawać karmę miękką (np. gotowaną, puszki) lub namoczoną karmę suchą
4. przez 2-4 doby po zabiegu może pojawiać się niewielka ilość krwi w jamie ustnej lub ślinie
5. codzienna kontrola: zmiana opatrunku, podanie antybiotyku i leku przeciwbólowego
6. w razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z lecznicą

 Lekarz: DO WIADOMOŚCI
FUNDACJI VIVA!

Podpis lekarza weterynarii