



NATOLIŃSKA LE CZNICA WETERYNARYJNA S.C.

ul. Belgradzka 3/UH9
02-793 Warszawa
Telefon: 22 - 816 83 33
E-mail: lecznica.natolin@gmail.com
Radiologia Cyfrowa DR
Badania i zabiegi endoskopowe

Zwierzę

Tomek Nr: 011800859

Gatunek: PIES

Rasa: Yorkshire Terrier

Płeć: samiec

Wiek: 7 lat

Oznakowanie:

Maść: stalowo - złota

Waga: 38,5 kg

Właściciel Nr: 011300380

**Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt
-Viva !**

Kawęczyńska 16 lok 39

03-772 Warszawa

Telefon: 506357299

Lekarz prowadzący: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Historia wizyt

01/08/2018 20:49: BADANIE I PROFILAKTYKA

OPIS WYWIADU

kulawizna od około 2 miesięcy, stwierdzono zwknięcie rzepki, ostatnio doszło zerwanie w ięzadeł krzyżowych, nóżka prawie w ogóle nie dostawiana
dostaje lek przeciwbólowy w syropie Matacam- od 4 dni, bez poprawy

OPIS BADANIA

W badaniu palpacyjnym obustronne zwknięcie rzepki II stopnia, w lewej dodatkowo zerwanie w ięzadła krzyżowego przedniego.

OPIS PROFILAKTYKI

Badanie krwi, badanie ogólne krwi

ZABIEGI

Konsultacja chirurgiczna

Badanie krwi

Badanie RTG - pierwsza projekcja

ZALECENIA

wskazany zabieg stabilizacji zerwanego w ięzadła kolanowego lewego ze stabilizowaniem zwkniętej się rzepki

zabieg operacyjny prawej kończyny za około 3 miesiące

 Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

08/08/2018 21:49: BADANIE

OPIS BADANIA

Bł. śluzowe różowe, wilgotne, CRT 1,5 sek, osłuchowo brak szmerów sercowych, szmery oddechowe prawidłowe, tętno zgodne z rytmem serca, dobrze wyczuwalne, ok. 90/min.

premedykacja: dexdomitor, bioketan, comfortan

indukcja znieczulenia: propofol, midanium z otw

podtrzymanie znieczulenia: znieczulenie w ziewne izofluranowe

analgezyja przedoperacyjna: melovem, biovetalgin

analgezyja śródoperacyjna: fentanyl bolus + FL CRI

analgezyja pooperacyjna: bunondol

znieczulenie miejscowe: lignokaina + adrenalina

Historia wizyt

Przebieg znieczulenia rutynowy. Płynoterapia krystaloidy 5 ml/kg/h.

ZABIEGI

WIEZADŁO KRZYŻOWE 2

+ repozycja rzepki

ZASTOSOWANE LEKI

Dexdomitor 0,5mg/ml	0,1	ml
COMFORTAN 10 MG/ML 10 ML	0,1	ml
Bioketan 10%	0,1	ml
Propofol-Lipuro 10mg/1ml	2	ml
LIGNOCAINUM H/CHLOR. 2%/2ml	1	sztuka
Adrenalinum INJ.0.1% 1MG/1ML	1	sztuka
Synulox inj. /100 ML, inj.	0,4	ml
Sposób podania: Injeksja podskórna		
Biovetalgin/ 100ml inj.	0,4	ml
Sposób podania: Injeksja podskórna		
Melovem 100ml	0,2	ml
Sposób podania: Injeksja podskórna		
PYRALGINUM TABL. 0,5G *12	2	tabletki
Dawkowanie: 1/3 tabl 2x dziennie		
Inj. Solutio Ringeri 500ML	1	sztuka

ZALECENIA

analgezja pooperacyjna;
pyralgina 1/3 tab 2x dziennie
bunondol po 0,2 ml co 8h

 Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

09/08/2018 20:14: BADANIE

Waga: 38,5 kg

OPIS WYWIADU

nie sikał od wczoraj, nic nie pił, nie chce jeść popiskuje
bunondol podany o 4 i o 12

OPIS BADANIA

Podaje bunondol i.v.
w enflon nie drożny, założono nowy.
Odwodnienie ok 6-7%
podano 130 ml płynów i.v.
W połowie kroplów ki-spacer i pies oddał mocz.
w ydał bunondol 0,2 ml do podania o 5 i o 13.
jutro popołudniu w izyta kontrolna, zostawiam venflon do jutra.

ZABIEGI

Założenie venflonu
Wizyta kolejna-ciąg dalszy leczenia
Kroplów ka iv-01

ZASTOSOWANE LEKI

Biovetalgin/ 100ml inj.	0,4	ml
Sposób podania: Injeksja podskórna		
Synulox inj. /100 ML, inj.	0,4	ml
Sposób podania: Injeksja podskórna		
Melovem 100ml	0,1	ml
Sposób podania: Injeksja podskórna		
Inj. Glucosi et Natrii Chloratii 1:1/500/	1	sztuka
Bunondol 0,3MG/ML	1	ml

 Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

10/08/2018 21:25: **BADANIE**

Temperatura: 38,5°C



OPIS WYWIADU

oddał mocz, ma apetyt, biegał przy bramie i szczekał
w właścicieli w domu podawali o 13 Bunondol



OPIS BADANIA

rana sucha, czysta
bł. śl. różowe, w ilgotne, CRT 1 sek

według właścicieli po zakończeniu działania Bunondolu troszkę popiskuje, więc w ydaję jeszcze dwie dawki do domu (z otw.)



ZABIEGI

Wizyta kolejna-ciąg dalszy leczenia
Ordynacja preparatu 10



ZASTOSOWANE LEKI

Rheumocam 1mg/ 100	2	sztuka
<i>Dawkowanie: 1/2 tabl 1 x dz od jutra wieczorem</i>		
Clavubactin 50/12.5 tabl.	10	tabletki
<i>Dawkowanie: 1 tabl 2 x dziennie od jutra wieczorem</i>		
PYRALGINUM TABL. 0,5G *12	2	tabletki
<i>Dawkowanie: 1/4 tabl 2 x dziennie od jutra wieczorem</i>		
Bioprotect kaps.	5	sztuka
<i>Dawkowanie: 1 kaps 1 x dziennie</i>		
Synulox inj. /100 ML, inj.	0,4	ml
Sposób podania: Iniekcja podskórna		
Biovetalgin/ 100ml inj.	0,4	ml
Sposób podania: Iniekcja podskórna		
Melovem 100ml	0,1	ml
Sposób podania: Iniekcja podskórna		



ZALECENIA

w ydaję leki do domu
zdjęcie szwów w 10ty dzień po zabiegu



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Podpis lekarza weterynarii