



**AMPULKA Przychodnia Weterynaryjna dla Zwierząt Różnych
w Mińsku Mazowieckim lek.wet. Agata Przetakiewicz**
ul. Warszawskie Przedmieście 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Telefon: 25 758 23 18; 501 448 864;
E-mail: przychodnia@ampulka.com.pl
czynne od pon. do pt. 9.00 - 20.00
sobota 10.00 - 20.00, niedziela 10.00 - 15.00



Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Zwierzę

Kicia

Gatunek:Kot

Rasa: Mieszaniec

Płeć: samica

Wiek: 3 lata i 2 miesiące

Oznakowanie:

Maść: tricolor

Właściciel

DO WIADOMOŚCI
FUNDACJI VIVA!

Lekarz prowadzący: Lek.wet. Agata Przetakiewicz

Historia wizyt

04/05/2017 09:14: Badanie

Opis wywiadu: kotek należący do rodziny ze wsi, 1/05 wrócił z kulawizną podporowa kończyny miednicznej lewej.

Opis badania:

U nas w badaniu palpacyjnym złamanie wysokie kości piszczelowej/strzałkowej, na radiogramie potwierdzono, zdjęcie nie jest najlepszej jakości, bo kotka ciężko było na żywca dobrze ułożyć, bała się bardzo.. Złamanie z przemieszczeniem kości piszczelowej i strzałkowej wysokiego typu zielona gałązka, kwalifikuje się do osteosyntezy prawdopodobnie zespolenie płyta, dokładna metodyka do potwierdzenia jak wykonane zostaną inne projekcje e w premedykacji. Podaję jej leki przeciwbólowe i przeciwzapalne .

Diagnoza: rtg

Zabiegi

RTG 2P.

Porada złożona pierwsza

Zużycie materiałów jednorazowych

Zastosowane leki

Tolfine 100 ml. 0,4 ml

Cepetor inj 1mg/ml 10 ml 0,2 ml

Torbugesic / 10 ml 0,1 ml

Ketamina 10% 0,1 ml

Zalecenia:

1. kotek z już prawie starym złamaniem 4 dniowym z przemieszczeniem obu kości podudzia lewego, wysokim, kwalifikującym się do założenia zespolenia wewnętrznego płytka kostną, wybite siekacze dolne
2. W premedykacji wykonano 2 zdjęcia rtg, w projekcji bocznej i AP, założono opatrunek unieruchamiający oraz usunięto wybite siekacze w ilości 3 sztuk (zuchwa) , podano tolfedynę
3. opatrunek nie na dłużej niż 4 dni, w razie zamoczenia koniecznie trzeba go zmienić
4. powinno się zrobić to złamanie w ciągu max 2-3 dni

Zarejestrował: Lek.wet. Agata Przetakiewicz

05/05/2017 13:12: Badanie

Opis wywiadu: Złamanie kości piszczelowej i strzałkowej lewej z dnia 1 maja

Opis badania:

Wykonano zabieg osteosyntezy kości piszczelowej lewej. Stabilizację odłamów uzyskano dzięki zastosowaniu stelaża zewnętrznego. Założono opatrunek miękki usztywniający na łączny okres 4 tygodni, pierwsza zmiana opatrunku za 14 dni. Wykonano RTG śródoperacyjne po uzyskaniu stabilizacji. We wlewie dożylnym podano NaCl z Duphalytem. Jako osłone antybiotykowa zastosowano Synulox do kontynuacji przez 7 dni. Jeśli stan kota w dniu

jutrzejszym pozwoli na to, kontynuacja antybiotykoterapii może odbywać się w warunkach domowych w postaci tabletkowej.

Diagnoza: Osteosynteza podudzia lewego.

Zabiegi

RTG 1P.

Chir.Osteosynteza doszypikowa kot

Podanie wlewu

Założenie venflonu

Zastosowane leki

Cerenia 20 ml 0,4 ml

Tolfine 100 ml. 0,3 ml

Synulox inj. 100 ml 0,3 ml

Duphalyte 500 ml 20 ml

Relanium inj 0,01 g / 2 ml 5 amp 1 amp

Venflon żółty 0,75 x 19 mm 1 szt

Nacl 0,9% worek 100 ml 1 szt

Wlewnik do kroplówki 1 szt

Pole operacyjne 75 x 90 niebieskie 1 szt

Cepetor inj 1mg/ml 10 ml 0,24 ml

Torbugesic / 10 ml 0,12 ml

Ketamina 10% 10 ml 2,5 ml

Zalecenia:

1. Po powrocie do domu poczekać na wybudzenie się koteczki,
2. Swobodny dostęp do picia po wybudzeniu.
3. W dniu dzisiejszym nie karmić, pierwszy posiłek podać jutro rano
4. Kontynuacja leczenia w dniu jutrzejszym. Wskazana antybiotykoterapia i leczenie przeciwbólowe przez 6 kolejnych
5. opatrunek miękki usztywniający założono na 4 tygodnie. Obecny należy zmienić za 2 tygodnie (bez stopy)
6. Opatrunek należy chronić przed zniszczeniem przez zwierzątko oraz zamoczeniem
7. Przez 2 tygodnie niezbędne jest maksymalne ograniczenie swobody ruchów(pobyt w domu najlepiej w klatce takiej jak dla królika, po 2 tygodniach możliwe jest rozszerzenie swobody na swobodny ruch poziomy (bez skoków)
8. Kontrola radiologiczna za 5 tygodni.
9. W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań oraz w przypadku zniszczenia przez zwierzątko opatrunku lub jego zamoczenia prosimy niezwłocznie pojawić się w lecznicy.

Zarejestrował: Lek.wet. Agata Przetakiewicz

06/05/2017 11:10: Badanie

Opis wywiadu: Czuje się nad wyraz dobrze. Pani odizlowała ją w brodziku. Je i zachowuje się całkiem normalnie

Opis badania:

Parametry badania klinicznego w normie

Diagnoza: Kontrola po OH

Zabiegi

Porada podstawowa kontynuacja

Zastosowane leki

Synulox inj. 100 ml 0,2 ml

Tolfine 100 ml. 0,33 ml

Zalecenia:

1. Wizyta jutro, jeżeli jutrzejsze samopoczucie będzie dobre - wydamy antybiotyk do domu (Synergol 50mg 2 razy dziennie)

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Bąbik

07/05/2017 11:22: Badanie

Opis wywiadu: Czuje się świetnie, mieszka w brodziku, je, wypróżnia się

Opis badania:

Parametry badania klinicznego w normie

Diagnoza: kontrola

Zabiegi

Porada podstawowa kontynuacja

Zastosowane leki

Synulox inj. 100 ml 0,2 ml

Tolfine 100 ml. 0,33 ml

Synergal 50 mg tabletki 50 10 tabletki

Meloxidyl 0,5 mg/ml 15 ml 1 but

Zalecenia:

1. Proszę przez kolejne 5 dni począwszy od jutra rana podawać:

- antybiotyk 1 tabletki rano i 1 tabl wieczorem

- lek p\bólowy i p\zapalny - syrop do pyszczka (dawka zgodnie z miarką na wagę 3,5kg)

2. Widzimy się z kicią dn 20.05. 17 na zmianie opatrunku

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Bąbik

20/05/2017 10:02: Badanie

Opis badania:

Zmieniam opatrunek i zakładam opatrunek usztywniający miękki z odsłoniętą stopą na kolejne dwa tygodnie.

Diagnoza: Po zabiegu osteosyntezy podudzia lewego.

Zabiegi

Porada podstawowa kontynuacja

Opatrunek usztywniający miękki

Zastosowane leki

Torbugesic / 10 ml 0,15 ml

Zalecenia:

Postępowanie z opatrunkiem tak jak poprzednio. Przed kolejną wizytą proszę o wcześniejszy kontakt z nami.

Zarejestrował: Lek.wet. Michał Żurawski

05/06/2017 09:45: -

Zabiegi

RTG 1P.

Chir.Usunięcie implantu

Zastosowane leki

ZOLETIL 25MG/ML+25MG/ML/ 50 0,3 ml

Tolfine 100 ml. 0,4 ml

Venflon żółty 0,75 x 19 mm 1 szt

Venflon fioletowy 26 g 0,6 mm 1 szt

Zalecenia:

1. Proszę na nią uważać jeszcze przez miesiąc, niech nie skacze i nie wygłupia się, bo zrost jest świeży

2. Po powrocie do domu może jeść i pić normalnie

Zarejestrował: Lek.wet. Agata Przetakiewicz

18/06/2017 10:04: Profilaktyka

Opis profilaktyki:

Szczepienie ochronne kota, VersiFel
Następny zabieg: 02/07/2017

Zabiegi

Szczepienie kota usługa

Zastosowane leki

Versifel CVR 1 ds 1 dawka

Zarejestrował: Lek.wet. Michał Żurawski

08/07/2017 10:05: Profilaktyka

Opis profilaktyki:

Szczepienie ochronne kota, VersiFel
Następny zabieg: 08/07/2018

Zabiegi

Szczepienie kota usługa

Zastosowane leki

Versifel CVR 1 ds 1 dawka

Zarejestrował: Lek.wet. Michał Żurawski

26/07/2017 18:19: Badanie

Opis badania:

Pokąsana prawdopodobnie przez owada. Obrzęk obejmuje część twarzową głowy.

Diagnoza: Obrzęk naczynio- ruchowy twarzy.

Zabiegi

Porada podstawowa pierwsza

Zastosowane leki

Adrenalina inj 0,1% 1mg / 1ml 10 szt 1 amp

Rapidexon 0,2% 100 ml 0,4 ml

Zarejestrował: Lek.wet. Michał Żurawski

Podpis lekarza weterynarii