

**NATOLIŃSKA LECZNICA WETERYNARYJNA S.C.**

ul. Belgradzka 3/UH9

02-793 Warszawa

Telefon: 22 - 816 83 33

E-mail: lecznica.natolin@gmail.com*Radiologia Cyfrowa DR**Badania i zabiegi endoskopowe*Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF EditorTo remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping**Zwierzę****Walker Nr: 011800566**

Gatunek: PIES

Rasa: Owczarek niemiecki

Płeć: samiec

Wiek: 6 lat

Oznakowanie:

Maść: ruda

Waga: 30 kg

Właściciel Nr: 011800396**DO WIADOMOŚCI
FUNDACJI VIVA!**

Lekarz prowadzący: Lekarz wet. Dr Joanna Pragacz

Karta informacyjna wizyty

11/05/2018 21:25: Badanie**OPIS WYWIADU**

Dziś pierwszy raz napady drgawkowe z niecałkowitą utratą przytomności, pierwszy o godzinie 18:20, w trakcie ataku pies otwierał szeroko oczy i głęboko oddychał, pomiędzy atakami całkowita utrata przytomności, nie oddał ani kału ani moczu. Każdy z ataków trwał około 30-40 sekund. Do godziny 21:00 około 7 ataków. Ostatni posiłek jadł rano, jednak ma stały dostęp do karmy więc nie do końca wiadomo.

Pies nie ma dostępu do żadnych trucizn ani nawozów, mieszka w kojcu, dziś rano jadł swoje standardowe jedzenie. Około miesiąc temu babeszjoza potwierdzona w gabinecie weterynaryjnym, nie wykonano badań biochemicznych krwi, dostał dwie krople ki dożylnie, nie kontynuowano leczenia ze względu na charakter psa.

Wcześniej nie wykazywał żadnych niepokojących objawów.

Jest psem adoptowanym, właściciele nie znają jego wczesniejszych losów. W schronisku nie miał żadnych ataków. W schronisku przechodził silne zapalenie płuc.

Jest zaszczepiony przeciwko wściekliznie i chorobom wirusowym.

Pies jest na co dzień agresywny.

Pies przywieziony nieprzytomny, mokry - właścicielka schładzała psa polewając go wodą.

**OPIS BADANIA**

Pies nieprzytomny, rogówka reakcyjna, błony śluzowe, ciemnoróżowe, wilgotne, CRT 1,5 sek, osłuchowo tony serca bez uchwytanych zmian, płuca bez uchwytanych zmian, wdech chłonne dostępne do badania niepowiększone, temperatura na wejściu 37,6 stopni C. 12 odd/min, HR 104/min.

21:08 Glukoza mierzona glukometrem w gabinecie 78 mg%.

21:10 Założono w kłucie dożylnie, pobrano krew na szeroki profil z jonogramem, podłączono Płyn Ringera VTBI 600 ml w tempie 400 ml/h. Pies w masce tlenowej.

21:40 kolejny atak (nr 8), w trakcie ataku opistotonus, ruchy płynackie. Podano propofol 4,5 ml i.v., atak ustąpił po 15 sekundach, źrenica reaktywna. Rezygnuję z podania diazepamu ze względu na brak informacji dot. wątroby.

22:00 temp. 37,5

22:20 pies po ataku nie odzyskuje przytomności, odruch rogówkowy zachowany, gałki oczne zrolowane. Pojedyncze ruchy kończyn, prawdopodobnie płynackie.

Oddechy/min bez zmian, HR 128/min.

22:25 podano 1ml propofolu i.v. Przygotowanie psa do wyjazdu do lecznicy całonocnej na nocny monitoring i wyciszenie w razie kolejnych ataków.

22:40 temp na wejściu 37,4 stopni C. Pies nadal nieprzytomny, odruch rogówkowy obecny, strzyże uszami po zawołaniu. Oddechy i HR bez zmian.

Wraz z tym pismem załączam badania krwi, oznaczenia hormonów tarczycy będą dopiero jutro. Proszę o kontakt w tej sprawie z lecznicą.

**ZABIEGI**

Wizyta pierwsza

TLENOTERAPIA

Założenie wenflonu

Pobranie krwi

Badanie krwi i 125

przesiew duży + T4 + fT4

Krople ki iv-01

Historia wizyt



ZASTOSOWANE LEKI

Propofol-Lipuro 10mg/1ml

5,5 ml



ZALECENIA

- nocny monitoring w lecznicy całodobowej
- diagnostyka w celu wykluczenia zaburzeń kardiologicznych oraz pełne badanie neurologiczne po odzyskaniu przez psa przytomności
- czekamy na wynik oznaczenia hormonów tarczycowych



Lekarz: Lekarz w et. Dr Joanna Pragacz

Podpis lekarza weterynarii