

**NATOLIŃSKA LECZNICA WETERYNARYJNA S.C.**

ul. Belgradzka 3/UH9

02-793 Warszawa

Telefon: 22 - 816 83 33

E-mail: lecznica.natolin@gmail.com*Radiologia Cyfrowa DR**Badania i zabiegi endoskopowe***Zwierzę****Tomek**

Gatunek: PIES

Rasa: Yorkshire Terrier

Płeć: samiec

Wiek: 7 lat i 4 miesiące

Oznakowanie:

Maść: stalowo - złota

Waga: 3,85 kg

Właściciel Nr: 011300380**Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt
-Viva !**

Kawęczyńska 16 lok 39

03-772 Warszawa

Lekarz prowadzący: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Karta informacyjna wizyty

30/11/2018 13:49: BADANIE**OPIS BADANIA**

Bł. śluzowe różowe, wilgotne, CRT 1,5 sek, osłuchowo brak szmerów sercowych, szmery oddechowe prawidłowe, tętno zgodne z rytmem serca, dobrze wyczuwalne, ok. 100/min.

premedykacja: dexdomitor, bioketan

indukcja znieczulenia: propofol, tiletamina + zolazepam

intubacja rurką dotchawiczą

preoxygenacja

podtrzymanie znieczulenia: znieczulenie w ziewne izofluranowe

analgezja przedoperacyjna: tolfina, biovetalgin

analgezja śródoperacyjna: fentanyl bolus + FLK CRI

analgezja pooperacyjna: tramal

Przebieg znieczulenia rutynowy, płynoterapia krystaloidy 5 ml/kg/h. Parametry życiowe podczas znieczulenia w zakresie norm. Dogrzewanie pacjenta w trakcie i po zabiegu.

Wybudzanie spontaniczne.

**ZABIEGI****Zabieg chirurgiczny***usunięcie łakotki w kolanie prawym***ZASTOSOWANE LEKI**

Dexdomitor 0,5mg/ml	0,3	ml
Bioketan 10%	0,2	ml
LIGNOCAINUM H/CHLOR. 2%/2ml	1	sztuka
Adrenalinum INJ.0.1% 1MG/1ML	1	sztuka
Propofol-Lipuro 10mg/1ml	1	ml
ZOLETIL 50MG/ML+50MG/ML/ 100	0,2	ml
Fentanyl WZF	1	ampułka
Synulox inj. /100 ML, inj.	1	ml
Sposób podania: Iniekcja podskórna		
Tolfina 100ml	1	ml
Sposób podania: Iniekcja podskórna		
PYRALGINUM 500MG 20 TABL.	1	szt.
Tramal Retard 100mg tab. 30 sztuk	1	tabletki
Sposób podania: Doustnie		
Biovetalgin/ 100ml inj.	0,5	ml
Sposób podania: Iniekcja podskórna		

ZALECENIA

Historia wizyt

- zwierzę po zabiegu powinno przebywać w cichym, spokojnym miejscu najlepiej na poziomie podłogi
- pierwszy posiłek wskazany jest dopiero na drugi dzień po zabiegu
- pić może 2h po zabiegu, początkowo woda jedynie na dnie miski
- zwierzę po zabiegu może chwilę nie chodzić i w okalizować - jest to spowodowane lekami podawanymi podczas znieczulenia
- proszę o ograniczenie aktywności ruchowej przez najbliższe kilka dni
- ochrona rany w postaci kołnierza lub ubranka do zdjęcia szwów (najczęściej jest to 10 dni, decyzja lekarza)
- prosimy o niepodawanie żadnych leków przeciwbólowych bez konsultacji z lekarzem (z wyjątkiem tych wydanych przez lekarza)
- prosimy nie zapominać o koniecznych wizytach kontrolnych zaleconych przez lekarza
- w razie jakichkolwiek pytań lub pojawienia się niepokojących objawów prosimy o pilny kontakt z lecznicą

ANALGEZJA POOPERACYJNA

wydano tramal i pyralginę w tabletkach



Lekarz: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Podpis lekarza weterynarii