



Klinika Weterynaryjna VETS
Waldemar Wośko
ul. Książęca 3
00-418 Warszawa
Telefon: 22 622-55-22, 22 622-56-22



Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Właściciel

DO WIADOMOŚCI
FUNDACJI VIVA!

Lekarz prowadzący: Grzegorz Łuchnaik

Zwierzę

Żaba

Gatunek: pies

Rasa: a

Płeć: samica

Data ur.: 17/08/2002

Oznakowanie:

Maść:

Waga: 7,1 kg

Historia wizyt

27/11/2017 18:11: Badanie

Temperatura: 38,0°C

Opis wywiadu: Czuje się już zupełnie dobrze, brzuch miękki, niebolesny, je i chętnie i nie wymiotuje, biegunki nie ma. T w normie.

Ropień przy lewym kłę szczęki, silny stan zapalny przyzębia - najpierw ten zabieg niż mastektomia.

Zabiegi

A Wizyta kontynuacja

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Plewińska - Pełka

02/12/2017 18:52: Badanie

Opis wywiadu: Krew kontrolnie przed zabiegiem.

Zabiegi

LAB WET Profil podstawowy <90>

POBRANIE KRWI NA PROFILE <40>

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Plewińska - Pełka

**LAB-WET**

Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne
02-661 Warszawa ul. Wita Stwosza 30
tel./fax 22 852-45-25 , Zlecenia 501-782-940
e-mail: biuro@labwet.pl www.labwet.pl

Książęca Pogotowie Weterynaryjne
"VETS"
Książęca 3
00-418 Warszawa

Nr mat. 203

Nr kontr. 187

Data: 2017-12-02



Jedn.kier:

Nr zlecenia: 9195526/17

Właściciel DO WIADOMOŚCI
Adres: FUNDACJI VIVA!

Rasa zw.

Gatunek: PIES

Wiek zw.

Imię zw. ŻABA

Badanie	Wynik	Jedn.	min	max	norma
Morfologia					
Leukocyty	8,50	G/l	6,0	12,0	~
Erytrocyty	6,26	T/l	5,5	8,0	~
Hemoglobina	8,80	mmol/l	7,45	11,17	~
Hematokryt	0,42	l/l	0,37	0,55	~
MCV	67	fl	60	77	~
MCH	1,40	fmol	1,18	1,55	~
MCHC	21,00	mmol/l	19,8	22,3	~
RDW	22	%	14	19	H
Płytki krwi	1105	G/l	200	580	H
MPV	7	fl	6	9	~
Rozmaz manualny wg Schillinga:					
Kwasochłonne	6	%	0	10	~
Segmentowane	62	%	60	77	~
Limfocyty	32	%	12	30	H
Obraz krwinek czerwonych:	Bez zmian				
Oznaczenia biochemiczne:					
AspAT	22,0	U/l	1	45	~
AlAT	28,0	U/l	3	60	~
ALP	130,0	U/l	5	155	~
Glukoza	83,0	mg/dl	70	120	~
Kreatynina	0,8	mg/dl	0,8	1,7	~
Mocznik	29,0	mg/dl	20	45	~
Białko całkowite	66,0	g/l	55	75	~
Albuminy	33,0	g/l	29,0	43,0	~

Dokument elektroniczny nie wymaga podpisu i pieczęci

04/12/2017 11:38: -

Zarejestrował: lek.wet. Jarosław Kopiński

Podpis lekarza weterynarii



Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxit.com/shopping

SZACIŁOWSKA MAGDALENA, 20171202221345

Lecznica: 1103, Książęca 3, 05-805 Warszawa, tel. 622 55 22, fax. 22 622 55 20

Lek. kier:

Nr zlecenia: 07714226

Data przyjęcia materiału: 24-04-2017 Data wyniku: 29-04-2017 Materiał: Wycinek / bionisia

Właściciel: DO WIADOMOŚCI FUNDACJI VIVA!

Gatunek: Pies Rasa: Mix Imię: Żaba Płeć: Wiek: 15 lat Identyfikator:

Badanie	Wynik	Jedn.	Norma
---------	-------	-------	-------

0201 HP

wynik badania nr: 1704-T-70580

Badanie makroskopowe:

Dostarczono wycinek tkanki gruczołu sutkowego z 4 sutkami, o wymiarach 2.6 x 3.5 x 3.3 cm, z licznymi guzowatymi masami tkankowymi o wymiarze od 1,2 cm do 3 cm. Do badania wybrano łącznie 11 skrawków, w tym guzki i krawędzie po chirurgicznym wycięciu.

Badanie mikroskopowe: Barwienie H&E wykonano z zastosowaniem standardowych procedur.

Na zbadanych skrawkach stwierdzono mnogie łagodne nowotworowe zmiany tkanki gruczołu sutkowego.

Na wycinku odpowiadającym pierwszemu sutkowi widoczne były liczne guzowate zmiany nowotworowe zbudowane z dobrze zróżnicowanego nabłonka kanalików. Kanaliki były wyścielone pojedynczymi warstwami komórek sześciennych po walcowate z umiarkowaną ilością kwasochłonnej cytoplazmy. Jądra były okrągłe po owalne, anizokarioza i anizocytoza były nieznaczne, a figury mitotyczne - nieliczne. Wszystkie guzy były dobrze odgraniczone i nie sięgały do krawędzi przecięcia.

Na wycinkach odpowiadających drugiemu sutkowi stwierdzono rozrost gruczołu sutkowego oraz jeden guzowaty nowotwór zbudowany z więcej niż dwóch populacji komórek. Komponent nabłonkowy był podobny do tego opisanego przy guzkach zlokalizowanych w pierwszym sutku. Komponent mioepitelialny składał się z komórek wrzecionowatych po gwiaździste z umiarkowaną ilością cytoplazmy. Dodatkowo widoczne były strefy dobrze zróżnicowanej tkanki chrzęstnej. Guz był dobrze odgraniczony.

Na wycinkach odpowiadających trzeciemu sutkowi widoczna była podobna zmiana nowotworowa do tej opisanej przy wycinkach pierwszego i drugiego sutka.

Na wycinkach odpowiadających czwartemu sutkowi tkanka gruczołowa i okoliczny węzeł chłonny były prawidłowe, bez zmian histologicznych.

Rozpoznanie:

Mnogie gruczolaki gruczołu sutkowego i łagodne, mieszane guzy gruczołu sutkowego

Komentarz:

Rozpoznano liczne łagodne guzy gruczołu sutkowego.

Nie stwierdzono żadnych oznak złośliwości.

Guzy gruczołu sutkowego występują często u psów.

Rokowanie przy pojedynczych guzach jest dobre, lecz możliwy jest wzrost kolejnych guzów w innych miejscach.

Nie można postawić rokowania względem pojawiania się ani znaczenia klinicznego kolejnych lub współwystępujących guzów.

*** END of report ***

Mrs. I. Casanova DVM



Klinika Weterynaryjna VETS
Waldemar Wośko
ul. Książęca 3
00-418 Warszawa
Telefon: 22 622-55-22, 22 622-56-22



Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

Właściciel

DO WIADOMOŚCI
FUNDACJI VIVA!

Lekarz prowadzący: Grzegorz Łuchnaik

Zwierzę

Żaba

Gatunek: pies

Rasa: a

Płeć: samica

Wiek: 14 lat i 8 miesięcy

Oznakowanie:

Maść:

Historia wizyt

24/04/2017 15:44: Badanie

Opis wywiadu: Zgoda fundacji VIVA na wykonanie zabiegu hemimastectomii, zdjęć RTG klatki piersiowej oraz wykonanie badania HP zmian

Opis badania:

Masa ciała 8 kg; temp. 38,5°C

Spojewki oraz sluzowki jasnorozowe, CRT ok 1s; masywny kamień nazebny i zaawansowana parodontozę
Powłoki brzuszne nie powiększone, nie napięte.

Omacywaniem liczne guzki w obu listawach mlecznych - w prawej guzki liczniejsze.

Z uwagi na rozległość dzisiejszego zabiegu, wiek psa oraz zgodę fundacji na działania dzisiaj tylko zabieg hemimastectomii; w przyszłości do rozważenia wykonanie zabiegu usunięcia drugiej listwy mlecznej, ew. w połączeniu z zabiegiem sterylizacji

W sedacji wykonano zdjęcia RTG klatki piersiowej w 2 projekcjach - w obrazie RTG brak zmian o charakterze neo

W znieczuleniu ogólnym (anestezji wziewnej) wykonano hemimastectomię po stronie prawej - liczne guzki w obrebie wszystkich gruczołów; dodatkowo usunięto(wyłuszczone) guzek zlokalizowany przy gruczole mlekowym L4 - guzek o średnicy ok 1 cm

Założono podwiązki naczyniowe Novosyn 2/0, Vicryl 2-0, Safil 0, szwy zbliżające Safil 0 oraz Vicryl 2/0, szwy zgłębiające Vicryl 2-0 oraz szwy wieloczęściowe skóry Dafilon 2/0, miejscami wzmocniona Ethibond 2/0
Zmiany(listwy mleczna) wysłano do badania histopatologicznego.

Zalecenia:

Dziś: zwierzęciu zapewniamy spokojne, ciepłe miejsce, bez możliwości wskakiwania czy zeskakiwania z wysokości.

Karmienie: najwcześniej po 12 godzinach od zabiegu tj. rano, porcja znacznie zmniejszona.

Dostęp do wody: zapewniamy dopiero po upływie 6 godzin od zabiegu (małymi porcjami).

Antybiotykoterapia: Enrobioflox do codziennej kontynuacji przez kolejne 7 dni

Przeciwbólowo: miejscowo zastosowano Bupivacainum + Lignocainum, s.c. Biovetalgin; i.v. Poltram

Ochrona rany: ranę operacyjną należy zabezpieczyć przed ingerencją ze strony zwierzęcia oraz przed jej zamoczeniem czy zabrudzeniem. Zalecamy ubranka ochronne lub/i kołnier.

Kontrolna wizyta: jutro u lekarza internisty; późniejsze wizyty w zależności od stanu ogólnego

Szwy: do zdjęcia po upływie 14 dni.

Inne:

* W przypadku obrzęków oraz działając przeciwbólowo sugeruje się 3 razy dziennie stosowanie zimnych okładów (pod osłoną ręcznika coldpack lub mrożonka warzywna - uwaga aby nie odmrozić skóry około 10-15 min)

* przez cały okres gojenia konieczne ograniczenie ruchu

* Histopatologia: w kwestii wyników proszę kontaktować się z rejestracją nie wcześniej niż po upływie około 10 dni

robotycznych od zabiegu.

Zabiegi

TLENOTERAPIA 2

Rękawiczki chirurgiczne 2

POLE CHIRURGICZNE

Materiały <5> 2

RTG <50>

HISTOPATOLOGIA DUŻA <180>

ZABIEG CHIRURGICZNY PROSTY 4

Zastosowane leki

Cepetor 0,15 ml

Butomidol 10ml 0,15 ml

VENFLON 0.8 (niebieski) 1 szt

PROPOFOL 1% 5AMP20ML 2 ml

Bioketan 10ml, 100mg/ml ketamina 0,2 ml

Izofluran 10 ml

NICI DAFILON 2 - 0 2 sztuka

NICI Safil 0 2 szt

NIC Vicryl 2 szt

NaCl/gluk 1:1 ml 130 ml

NaCl 250ml 100 ml

Lignocainum 20mg/ml, 20 ml 0,2 ml

Bupivacainum 0.5% 0,2 ml

SOLVERTYL 25 mg/2ml ampułki 0,5 ml

Poltram 50 0,5 ml

Enrobioflox 5% 0,8 ml

Biovetalgin 50% inj 100 ml 0,8 ml

Cyclonamine 12.5% 0,5 ml

Zarejestrował: lek.wet. Piotr Radziszewski

24/04/2017 18:59: Badanie

Opis wywiadu: podano leki oraz wydano pacjenta ze szpitala. Wydrukowano epikryzę

Zastosowane leki

Poltram 50 0,5 ml

Zarejestrował: lek. wet. Magdalena Sobczyk

Podpis lekarza weterynarii