



Przychodnia Weterynaryjna "AMIGO"
lek. wet. Łukasz Steinhoff
ul. Prosta 35/1
25-371 Kielce
Telefon: 41-362 94 02

Zwierzę

Ren

Gatunek: Pies
Rasa: Owczarek niemiecki
Płeć: samiec
Wiek: 10 lat
Oznakowanie:
Maść: Czarny podp

Właściciel

Viva Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt
ul. Kwańczyńska 16/39
03-772 Warszawa

Lekarz prowadzący: Łukasz Steinhoff

Historia wizyt

10/10/2016 21:03: Badanie i diagnostyka

Opis wywiadu: Pies bezdomny pod opieką Fundacji . Duży powierzchownie uszkodzony guz z lewej strony odbytu .
Duża przepuklina pachwinowa zawierająca jelita , dająca się odprowadzić . Problemy przy wstawianiu -
wyszywnienie tylnych kończyn . Masywne zgrubienia w okolicy stawów łokciowych . Ślepotą . Diagnozowany w
innej lecznicy - badania przeglądowe krwi w normie .

Opis badania:

Guz okolicy odbytu j.w . Masywny rozrost prostaty z torbielami . Duża przepuklina pachwinowa zawierająca jelita .
Zaawansowane zmiany w stawach , zwłaszcza w łokciowych i biodrowych . Spondyloza . Ślepotą - do dokładnej
diagnostyki . Starcze zmętnienie soczewek oczu . Zaburzenia neurologiczną tylnych kończyn (związane z
kręgosłupem)

Wykonano badania diagnostyczne.

Zastosowane leki

Wizyta z badaniem usg 1 szt.
Zdjęcie rtg 1 klisza 1 szt.

Zalecenia:

Zalecono kastrację wraz z usunięciem guza okolicy odbytu oraz operacją olbrzymiej przepukliny pachwinowej -
zabieg jest dość ryzykowny ze względu na wiek i stan ogólny zwierzęcia ale jest jedyną szansą poprawy stanu psa .
Ze względu na torbiele prostaty zalecamy wcześniejszą antybiotykoterapię (chinolony - np enrofloksacyna - przez 14
dni

Zarejestrował: Łukasz Steinhoff

RTG

Parametr

Data badania	10/10/2016
Opis zmian	Zdjęcie w projekcji bocznej l-p . Sylwetka serca - indeks VHR 11,0 Brak widocznych ognisk nowotworowych na terenie klatki piersiowej . Tchawica prawidłowa . Powietrzność płuc prawidłowa . Widoczna spondyloza w odcinku piersiowym kręgosłupa .

USG

Parametr

Data badania	10/10/2016
Opis zmian (OPIS_ZM_US)	Gruzoł krokowy powiększony , wymiary ok 7,5 x 5 cm . Struktura heteroechogenna , widoczne torbiele - największa o średnicy ok 3 cm w lewym płacie gruczołu oraz kilka mniejszych w obu płatach . Pęcherz moczowy - silnie

wypełniony , atoniczny o ściennałej ścianie , sięgający aż do przodobrzusza (zalecono zróżnicowanie z olbrzymią torbielą zewnątrzsterczową - przed badaniem pies wysiusiał się) , bez zmnineralizowanych złogów . Nerki - prawidłowa wielkość , struktura nieco zatarta , bez złogów . Śledziona prawidłowa , bez zmian ogniskowych . Wątroba prawidłowej wielkości i o nieco podwyższonej echogeniczności , miąższ jednorodny bez zmian ogniskowych , pęcherzyk żółciowy wypełniony ,bez złogów . Żołądek słabo wypełniony , pole trzustkowe nieposzerzone .

Podpis lekarza weterynarii