



**ANIMAL  
CENTER**

**Animal Center Zofia Gaińska**  
ul. Zamiany 12  
02-786 Warszawa  
Telefon: 224141812  
E-mail: [biuro@animal-center.pl](mailto:biuro@animal-center.pl)

#### Zwierzę

##### **Żuberek Zwierzaki z Mińska**

Gatunek: Kot

Rasa: Mieszaniec

Płeć: samica

Wiek: 3 lata i 8 miesięcy

Oznakowanie: 616093900340898

Maść:

#### Właściciel

##### **Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!**

Kawęczyńska 16 lok 39

03-772 Warszawa

Telefon: 790817818, 691 378 288, 785 811 792

Lekarz prowadzący: Zofia Gaińska

## Historia wizyt

### **30/06/2017 16:13: Badanie**

Opis wywiadu: Dzisiaj kot podrzycony, brak jednej z kończyn.  
Całkiem łagodny.  
Zostaje na diagnostykę w szpitalu.

#### **Opis badania:**

błony śluzowe różowe, ww chłonne żuchwowe powiększone, silne zapalenie spojówek, wypływ ropny, zielony, test fluoresceinowy ujemny, osłuchiwanie utrudnione przez mruczenie, brzuch niebolesny, mocno zgazowany, jądra w mosznie

kikuty k piersiowej i miedniczej lewej - prawdopodobnie stary uraz na k piersiowej obtarcia i strupy

test bibułowy ujemny

brzegi małżowin usznych zestrupiałe  
dotknięcie odruch otopodalny  
kanał słuchowy prawy - świerzbowiec, ropa?  
kanał słuchowy lewy - spora ilość woszczyzny

#### **Zabiegi**

Pobyt doba bezdomne  
Czyszczenie Uszu  
Pobranie krwi fundacja  
Snap Combo Plus (felv/Fiv)  
*ujemne!!!*

#### **Zastosowane leki**

Inne materiały 1 szt  
ORIDERMYL / 10 G 1 szt.  
TOBREX krople do oczu 1 szt.  
Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

#### **Zalecenia:**

- Oridermyl 1 raz dziennie do obu uszu
- Bioimmunex felis 1 kaps 1 raz dz
- Difadol + 10 min przerwy Tobrex - 3 razy dziennie

- zbiórka kału
  - dzisiaj badania krwi
  - dalsze zalecenia zależnie od stanu
  - w dalszej kolejności kastracja
- Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

**30/06/2017 19:47: -**

**Zabiegi**

Vetlab - profil dla fundacji

Zarejestrował: AA Laboratorium

**01/07/2017 14:47: Badanie**

Opis wywiadu: Czuje się bardzo dobrze, szybko się zaaklimatyzował.  
Nie oddał dziś jeszcze kału i moczu.  
Apetyt zachowany.

Wyniki krwi dobre.

**Opis badania:**

Błony śluzowe różowe, wilgotne, crt1,5s.

Kamień nazębny średniego stopnia, możliwa resorpcja 108/109 ?, odsłonięte korzenie kłów szczęki (104,404).

Konieczna stomatologiczna kontrola radiologiczna. Fetor ex ore.

Spojówki lekko zaczerwienione, rozpulchnione. Widoczna duża ilość ropnej wydzieliny z obu oczu, w większej ilości z oka prawego (zalepiająca całą szparę powiekową). W oku prawym widoczne entropium.

Powłoki brzuszne napięte podczas omacywania, jama brzuszna miękka, niebolesna.

Osluchiwanie utrudnione przez mruczenie.

Oczyszczono ranę na lkp, odmoczono strupy i przemyto octeniseptem, ranę posmarowano żelem anigran. Założono opatrunek - lkp

**Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

**Zastosowane leki**

Inne materiały 1 szt

Anigran Żel 0,3 ml

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

**Zalecenia:**

- We wtorek konsultacja ortopedyczna (dr Juliusz Lipiński)
- Codziennie przemywanie i zakraplanie oczu 3x dz.( Difadol + Tobrex z 10 min przerwą pomiędzy lekami) przez min 2 tygodnie - do 14.07
- Oridermyl do obu oszu 1 raz dziennie do 21.07
- Kontynuacja zbiórki kału do badania
- Lizyna (p/w wirusowo) i bioimmunex (na wzmocnienie odporności) 1 raz dziennie
- W dalszej kolejności kontrola stomatologiczna i kastracja.

Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

**03/07/2017 13:48: Badanie**

Opis wywiadu: oddał niewielką ilość kału, po nocy bez moczu

**Opis badania:**

4,45 kg

temp 38,1

zapalenie spojówek,

niewielki kamień nazębny, ww chł żuchwowe miernie powiększone,

osłuchowo mruczy,

brzuch miękki, o powiększonym obrysie, silnie zgazowany, pęcherz dość znacznie wypełniony moczem, w świetle

pojedyncze złogi tkankowe,

badanie USG po głodówce/wypróżnieniu - jutro

**Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

**Zastosowane leki**

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

**04/07/2017 08:20: Badanie**

Opis wywiadu: duży apetyt,

samopoczucie dobre

oddaje kał - niestety poza kuwetą - uformowany, zwarty,

po nocy nie oddał moczu

**Opis badania:**

temp 38,4

dzisiaj kontrola dermatologiczna u dr Kłucjasz

w bad klinicznym jak wcześniej

w skróconym badaniu USG

pęcherz moczowy wielkości pomarańczy, wypełniony moczem z obecnością licznych drobnych złogów tkankowych,

nerki o cechach powiększenia, wymiarów około 4,6x2,8cm, o miernie wzmożonej echogeniczności kory, stosunku

kora/rdzeń prawidłowym - do ewentualnej kontroli

podano krople do oczu

**Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

**Zastosowane leki**

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

**04/07/2017 12:05: Badanie****Opis badania:**

Kanały słuchowe ładne w badaniu otoskopowym, bez wydzieliny, błona bębenkowa nieuszkodzona.

Brzegi zewnętrznych powierzchni małżowin usznych - przetyśnienia, skrajnie zmiany jak obszary martwicy na lewym uchu.

Na grzbiecie nosa zabrudzenie, skóra nieuszkodzona.

Na lewych kończynach w miejscu oparcia kikuta o podłoże widoczne bolesne, zmiany skórne - wyłysienie, strupienie, krwiak.

**Zalecenia:**

- kontynuacja oridemyłu do 21 lipca włącznie

- dziś decyzja chirurga o interwencji w zakresie łapek

Zarejestrował: lek. wet. Maria Kłucjasz

**04/07/2017 18:15: Badanie****Opis badania:**

Amputowane dwie kończyny : lkp w stawie nadgarstkowym (widoczny pozostały jeden pazur), lkm w stawie skokowym.

Wskazane wykonanie badania TK w celu dopasowania protez stawów.

**Zabiegi**

kontynuacja leczenia

Zarejestrował: lek.wet. Juliusz Lipiński

**05/07/2017 09:36: -**

**Zabiegi**

Vetlab - posiew mocz z antybiogramem

Mocz + kreatynina

Zarejestrował: AA Laboratorium

**05/07/2017 09:38: Badanie**

Opis wywiadu: Od wczoraj nie oddał moczu ani kału - pęcherz wielkości pomarańczy.

Apetyt w normie, samopoczucie dobre, wokalizuje dość często.

Chipowanie- prośba p. Ostrowskiej.

**Opis badania:**

blony śluzowe różowe, entropium oka prawego, obrzęk spojówek obustronny, osłuchiwanie niemożliwe, obrys brzucha powiększony, duży pęcherz moczowy, okolica niebolesna

toaleta lkp - założenie opatrunku z anigranem

**Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

Pobranie moczu

Opatrunek I

Chipowanie

Mikroczip - blue label/ 1 szt.

616093900340898

**Zastosowane leki**

NO-SPA INJ 0,04G/2ML 5 AMP. 1 AMP.

Inne materiały 1 szt

**Zalecenia:**

- konsultacja okulistyczna w najbliższą środę
  - czekamy na wyniki moczu (+posiewu)
  - obserwacja pod kątem oddawania moczu
  - krople do oczu, oridermyl jak wcześniej
  - jutro zmiana opatrunku
  - w dalszej kolejności kastracja, sanacja jamy ustnej, zabieg chirurgiczny (protezy)
- Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

**06/07/2017 11:46: -**

**Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

Opatrunek I

**Zastosowane leki**

NO-SPA INJ 0,04G/2ML 5 AMP. 1 AMP.

Inne materiały 1 szt

**Zalecenia:**

- konsultacja okulistyczna w najbliższą środę

- czekamy na wyniki moczu (+posiewu)
  - obserwacja pod kątem oddawania moczu
  - krople do oczu, oridermyl jak wcześniej
  - jutro zmiana opatrunku
  - w dalszej kolejności kastracja, sanacja jamy ustnej, zabieg chirurgiczny (protezy)
- Zarejestrował: lek. wet. Anna Misiak

## 07/07/2017 16:13: Badanie

Opis wywiadu: Samopoczucie bez zmian, w klatce głównie śpi  
apetyt w normie

### Opis badania:

błony śluzowe różowe, wilgotne, kamień nazębny, fetor ex ore,  
spojówki rozpalnione, zaczerwienione, dookoła oczu spora ilość ciemnej zaschniętej wydzieliny, entropium w oku  
prawym,  
węzły chłonne obwodowe niepowiększone,  
bez osłuchiwania- mrczy  
powiększony obrys jamy brzusznej, brak bolesności podczas badania, wyczuwalne zbite masy kałowe, pęcherz  
moczowy niewyczuwalny  
stan zapalny gruczołów okołodbytowych? nie pozwala na dokładne badanie, okolica obrzęknięta, tkliwa, gruczoły  
mocno przepelnione, mlecznobiała wydzielina

proszę jutro o kontrolę gruczołków

### Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Opatrunek I

### Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

LOXICOM 5MG 0,15 ml.

SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2 ML 1 szt.

### Zalecenia:

- konsultacja okulistyczna w najbliższą środę
  - czekamy na wyniki moczu (+posiewu)
  - obserwacja pod kątem oddawania moczu
  - krople do oczu, oridermyl jak wcześniej
  - jutro zmiana opatrunku
  - granuflex w żelu na rany zamiast anigranu (zamówione 2 sztuki)
  - w dalszej kolejności kastracja, sanacja jamy ustnej, zabieg chirurgiczny (protezy)
- Zarejestrował: lek. wet. Anna Misiak

## 07/07/2017 16:40: Badanie

### Opis badania:

Skóra na kikutach nadal tkliwa, w trakcie gojenia.  
Zamawiamy granuflex żel (bardziej ekonomiczny niż anigran).

### Zalecenia:

- raz dziennie toaleta i smarowanie ran
- Zarejestrował: lek. wet. Maria Kłucjasz

## 08/07/2017 13:12: Badanie

Opis wywiadu: Samopoczucie ok, śpi mruży.

Chętnie zjadł.

### Opis badania:

Węzły chłonne obwodowe w normie.

Spojówki jasnoróżowe, obrzęknięte. prawe oko przymrużone ( Entropium).

Uszy czyściutkie. Oczyszczono Cerumaural + Oridermyl.

Błony śluzowe jamy ustnej różowe, wilgotne, Crt 1,5 sek.

Osluchowo mruży.

Podczas omacywania jamy brzusznej lekko napina się. Rano brak moczu w kuwecie, pęcherz wypełniony miernie, próba wyciśnięcia moczu nieudana.

Na amputowanej kończynie piersiowej podkrwawiająca rana, zaczerwioniona skóra. W kończynie miednicznej również skóra lekko zaczerwieniona. Toaleta rany + anigran.

W okolicy gruczołu okołoodbytoowego prawego lekki obrzęk, lewy w normie. W gruczołach brak wydzieliny.

### Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Opatrunek I

### Zastosowane leki

Anigran Żel 1 ml

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml \* 5amp. 1 5amp.

METACAM 5 MG/ML INJ 100 ML 0,15 ML

### Zalecenia:

- konsultacja okulistyczna w najbliższą środę
  - czekamy na wyniki moczu (+posiewu)
  - obserwacja pod kątem oddawania moczu ( ew No-Spa)
  - krople do oczu, oridermyl jak wcześniej
  - jutro zmiana opatrunku ( do rozważenia skarpetki niemowlęce na oba kikuty do czasu wygojenia ran)
  - granuflex w żelu na rany zamiast anigranu (zamówione 2 sztuki)
  - w dalszej kolejności kastracja, sanacja jamy ustnej, zabieg chirurgiczny (protezy)
- Zarejestrował: Animal Center

## 10/07/2017 16:03: Badanie

Waga: 4,35 kg

Opis wywiadu: Czuje się dobrze, w nocy oddał mocz i kał. Apetyt zachowany.

W wynikach kału stwierdzono obecność Giargia sp.

Wyniki moczu dobre, jednak ze względu na b. rzadkie oddawanie moczu wskazana kontrola USG.

### Opis badania:

Błony śluzowe jamy ustnej różowe, wilgotne, crt2s, Stan jamy ustnej bez zmian.

Spojówki lekko zaczerwienione, mniej rozpulchnione, węzły chłonne obwodowe bez zmian.

Półprzymknięta powieka oka prawego, w obu oczach widoczna obecność ropnej wydzieliny.

Jama brzuszna lekko wzdęta, niebolesna.

Osluchowo mrużenie.

Rana na łapce goi się, nadal widoczne ropne podminowanie. Wstrzymujemy się z ew. antybiotykiem do konsult. okulistycznej.

### Zabiegi

Pobył doba bezdomne 2

rozliczenie za 09 i 10.07

Opatrunek I

**Zastosowane leki**

GRANUGEL ZEL 15G 1 0P

Inne materiały 2 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 2 szt.

**Zalecenia:**

- konsultacja okulistyczna w najbliższą środę -> krople do oczu (min do środy do konsult. okulistycznej)
- obserwacja pod kątem oddawania moczu ( ew No-Spa)
- kontrolne USG pęcherza i jamy brzusznej ( czw. dr Złot)
- Oridermyl 1 raz dziennie do obu uszu do 21.07
- kontrola rany na łapce i zmiana opatrunku wedle potrzeby (granugel na rany )
- w dalszej kolejności kastracja, sanacja jamy ustnej, zabieg chirurgiczny (protezy)
  
- Odrobaczenie : Aniprazol 1/2 tabl od dziś przez 5 kolejnych dni, następnie dwa tygodnie przerwy i powtórzenie schematu (od 28.07).

Dwa tygodnie od drugiego cyklu odrobaczenia kontrolne badanie kału ( zbiórka od 15.08)

Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

**11/07/2017 14:24: Badanie**

Opis wywiadu: Czuje się dobrze, apetyt zachowany.  
Mocz oddał na podkład na podłodze klatki, kał w normie.

Rano ropna wydzielina w oku, oczyszczono.

**Opis badania:**

Błony śluzowe jamy ustnej różowe, wilgotne, crt 2s. Stan jamy ustnej bez zmian.

Spojówki lekko zaczerwienione, generalnie stan oczu poprawia się.

Węzły chłonne obwodowe bez zmian.

Jama brzuszna miękka, niebolesna, jelita lekko wzdęte.

Osluchowo bez nieprawidłowości.

Oczyściłam ranę łapce, na razie bez opatrunku, proszę o kontrolę popołudniu.

**Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

**Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 1 szt

Urikrill Gatto 1 szt.

**Zalecenia:**

- konsultacja okulistyczna w najbliższą środę -> krople do oczu (min do środy do konsult. okulistycznej)
- obserwacja pod kątem oddawania moczu ( ew No-Spa)
- kontrolne USG pęcherza i jamy brzusznej ( czw. dr Złot)
- kontrolne badanie moczu pobranego z naturalnej mikcji ( jak tylko uda się złapać mocz)
- Urikrill gatto przez min. następny miesiąc. (do 10.08)
- Oridermyl 1 raz dziennie do obu uszu do 21.07
- kontrola rany na łapce i zmiana opatrunku wedle potrzeby (granugel na rany )
- w dalszej kolejności kastracja, sanacja jamy ustnej, zabieg chirurgiczny (protezy)

- Odrobaczenie : Aniprazol 1/2 tabl od dziś przez 5 kolejnych dni, następnie dwa tygodnie przerwy i powtórzenie schematu (od 28.07).

Dwa tygodnie od drugiego cyklu odrobaczenia kontrolne badanie kału ( zbiórka od 15.08)

Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

## 11/07/2017 15:04: Badanie

### Opis badania:

Wyłysienie za lewą łopatką - średnica około 0,5 cm oraz na prawym biodrze - średnica około 3 cm.

W badanej zeszkrobinie i trichogramie bez nieprawidłowości.

### Zalecenia:

- badanie w kierunku dermatofitów (PCR, laboklin) do ustalenia z panią Ostrowską

Zarejestrował: lek. wet. Maria Kłucjasz

## 12/07/2017 08:56: Badanie

Opis wywiadu: Samopoczucie dobre, apetyt w normie.

Problem z oddawaniem moczu i kału - duże odstępy.

### Opis badania:

błony śluzowe różowe, w chłonny prawy nieco powiększony, stan spojówek lepszy, brzuch wzdęty, bez bolesności przy omacywaniu, kanały słuchowe z niewielką ilością płynu, w lewym kanale nadżerka?

założono opatrunek ochronny na kikut kończyny piersiowej - na razie bez wdrażania Ab.

podano aniprazol

### Zabiegi

Pobył doba bezdomne

### Zastosowane leki

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 1 szt

Urikrill Gatto 1 szt.

Aniprazol tabl 1 szt.

### Zalecenia:

- konsultacja okulistyczna w najbliższą środę -> krople do oczu (min do środy do konsult. okulistycznej)

- kontrolne USG pęcherza i jamy brzusznej ( czw. dr Złot)

- Urikrill gatto przez min. następny miesiąc. (do 10.08)

- Oridermyl 1 raz dziennie do obu uszu do 21.07

- kontrola rany na łapce i zmiana opatrunku wedle potrzeby (granugel na rany )

- w dalszej kolejności kastracja, sanacja jamy ustnej, zabieg chirurgiczny (protezy)

- Odrobaczenie : Aniprazol 1/2 tabl od dziś przez 5 kolejnych dni, następnie dwa tygodnie przerwy i powtórzenie schematu (od 28.07).

Dwa tygodnie od drugiego cyklu odrobaczenia kontrolne badanie kału ( zbiórka od 15.08)

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

## 12/07/2017 11:35: Badanie



Opis wywiadu: Jasio skierowany na konsultacje okulistyczną

**Opis badania:**

W badaniu entropium dolnej powieki oka prawego. Wrzodziejące zapalenie rogówki oka prawego w dolnym kwadrancie rogówki, neowaskularyzacja rogówki.

Ropne zapalenie spojówki w obu oczach - podejrzenie chlamydiozy spojówki?

IOP L 12 mmHg

IOP P 11 mmHg

Dno oka lewego i prawego bez uchwytanych zmian.

**Zabiegi**

Wizyta pierwsza

**Zalecenia:**

- skierowanie na zabieg plastyki entropium dolnej powieki
- przed zabiegiem kontrolne bad krwi
- ogólnie : Unidox przez 14 dni , wg. wagi , osłonowo probiotyk
- do oczu:

Vigamox 4 razy dz. po 1 kropli do obu oczu 2-3 tyg.

10 minut przerwy

Comeregel 2-3 razy dz. do obu oczu 2-3 tyg.

Zarejestrował: lek.wet. Oliwia Łobaczewska

**13/07/2017 08:55: Badanie**

Opis wywiadu: Samopoczucie dobre, apetyt zachowany, głównie przysypia.

Po nocy w kuwecie mocz i kał (prawidłowo uformowany, duża objętość)

Dzisiaj pierwsza dawka unidoxu.

Jutro ostatnia dawka aniprazolu.

**Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

**Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 1 szt

Urikrill Gatto 1 szt.

Aniprazol tabl 1 szt.

Unidox solutab 100mg tab 1 szt.

**Zalecenia:**

- dzisiaj o godzinie 18.00 USG jamy brzusznej u dr Zlot
- Urikrill gatto podajemy minimum do 10.08,
- Oridermyl 1 raz dziennie do obu uszu do 21.07,
- kontrola rany na łapce i zmiana opatrunku wedle potrzeby (granugel na rany )
- w dalszej kolejności kastracja, sanacja jamy ustnej, zabieg chirurgiczny (protezy)
- wg zaleceń okulisty:

\*ogólnie:

- UNIDOX 1/2 tabletki 1 raz dziennie przez 14 dni

\*do obu oczu z zachowaniem 10 minutowego odstępu:

- Vigamox 4 razy dziennie po jednej kropli do obu oczu (łącznie 2-3 tygodnie)
- Comeregel 2-3 razy dziennie do obu oczu 2-3 tygodnie
- Aniprazol: 1/2 tabletki do piątku (14.07) łącznie, następnie dwa tygodnie przerwy i kolejne pięciodniowa kuracja OD 28.07
- kontrolne zbiórka kału do badania od 15.08 (dwa tygodnie po ukończeniu drugiej serii odrobaczania)

Zarejestrował: lek. wet. Anna Misiak

## 13/07/2017 18:04: Badania diagnostyczne

Wykonano badania diagnostyczne.

### Zabiegi

USG jamy brzusznej

Zarejestrował: lek. wet. Anna Zlot

## USG

### Parametr

Data badania

13/07/2017

Opis zmian (OPIS\_ZM\_US)

Badanie usg j brzusznej:

Wątroba zachowanej wielkości, niepowiększona, brzegi gładkie, nieznacznie zaokrąglone doogonowo, echogeniczność miąższu nieznacznie niejednorodna, wzmożona, komponenta pozapalna, przewlekła. Bez wyraźnych cech zwyrodnieniowych, stłuszczeniowych. Nieuwidoczne zmiany rozrostowe, ew deformujące płaty. Pecherzyk żółciowy wypełniony aechogenicznie, torebka silnie echogenna, bez zmian zapalnych, rozrostowych. W świetle, przysciennie, zauważalne, w niewielkiej ilości, drobne zageszczenia echogennej żolci, niewielka ilość osadu wewnątrz. Ukł żółciowy nieposzerzony.

W ok przywnekowej, wzdłuż unaczynienia, niezauważalne zmienione węzły chłonne.

Zauważalne, nieznacznie zmienione zapalnie przewlekłe, ww chłonne w śródbrzuchu, w ok korzenia krezki, wzdłuż unaczynienia, za ujściem bso. Ich echogeniczność o niewielkiej niejednorodności, zmniejszeniu, podłużne/owalne, gr do ok 4-5mm. Bez rozlanego nacieku zapalnego w j otrzewnej, w ok ww chłonnych.

Węzły chłonne zaotrzewnowe, biodrowe przysrodkowe, bez wyraźnych zmian.

Sledziona miernie powiększona, brzegi odc pofałdowane, zawinięte, wzdłuż pasmo torebkowe, silnie echogenne. Gr miąższu do ok 11mm. Echogeniczność miąższu o nieznacznej niejednorodności, komponenta przebudowy zapalno/pozapalnej, przewlekłej.

Bez cech zastojów w krążeniu żylnym miąższowym, w łożysku naczyniowym.

Bez wolnego płynu aechogenego w j otrzewnej.

Płaty trzustkowe bez cech przerostowo zapalnych, nieznacznie niejednorodnej echogeniczności, o nieznacznym pofałdowaniu brzegów, wzdłuż pasmo torebkowe, hyperechogenne. Gr miąższu do ok 7-8mm. Nieuwidoczny poszerzony przewód trzustkowy.

Przewód pokarmowy wypełniony pewną znaczną ilością treści pokarmowej, echogennej, treść głównie płynna, w świetle żołądka zageszczona. Niejednorodne zgasowanie przew pok, na całej dł, przysciennie, w treści. Światło przew pok bez niedrożności, perystaltyka raczej jak prawidłowa. W j grubym masy echogenne, uformowane, cien akustyczny, większa ilość mas, pasma gazu. Widoczne odc ściany żołądka, ok dna, trzonu, przedodźwiernikowo, pofałdowane, o zachowanej strukturalności, bez zauważalnych zmian zapalno naciekowych. Odźwiernik bez

zmian, nieposzerzony, sciana j cienkiego na przebiegu, ok ujscia bso, sciana j grubego, bez zauwazalnych zmian, zachowana strukturalnosc sciany. Ujscie bso nieposzerzone.

Nerki zachowanej wielkosc, ew mozliwie nieznacznie powiekszone? ok 46-47x27-28mm, torebka wokol silniej echogenna, miernie pofaldowana. Strukturalnosc kora rdzen zachowana prawidlowo. Echogenicznosc miazszu ogolnie wzmozona, niejednorodna. Komponenta przebudowy przewleklej, cechy zapalno/pozapalne, przewlekle podraznienie miazszu, odmiedniczkowo. Komponenta zatarcia na granicy, zapalnie/pozapalnie, niewielkie zatarte pasmo rabka silniej echogenego. Bez cech trwalych zwyrodnieniowo dysplastycznych. Mozliwa komponenta drobnych, pozapalnych zwloknien okolordzeniowo. Bez zastoju, nieposzerzone miedniczki nerkowe, ok moczowodow bez zmian. Wewnatrz miedniczek nerkowych, obustronnie, zauwazalne drobne, w niewielkiej ilosci, mineralizacje. Nadnercza bez zmian. Pecherz moczowy wypelniony aechogennie, znacznie, sciana niejednorodna, silniej echogenna, od wewn pofaldowana, rozpulchniona przewlekle, warstwa sluzowa. Gr sciany do ok 2,2-2,4mm, komponenta zapalna przewlekla, bez zmian rozrostowych. Wewnatrz, glownie wolnoplywajaco, ale i przysciennie, zauwazalne liczne, drobne zageszczenia echogenne, tkankowe, zapalne oraz b drobne mineralizacje, komponenta zalegania nieregularnie mieszanego osadu przysciennie. Przewaga jednak zageszczen echogenych, tkankowych w osadzie. Niezauwazalne wieksze, lite, uformowane kamienie zmineralizowane. Ok ujscia, widoczny odc cewki moczowej, bez poszerzenia, w ok ujscia sciana gr ok 2mm, cechy takze przewlekle, zapalne.

lek wet ania zlot  
604091338

## 14/07/2017 14:22: Badanie

Opis wywiadu: Jasio czuje sie dobrze, apetyt ma zachowany.

Kal i mocz oddaje prawidlowo

### Opis badania:

Blony sluzowe jamy ustnej rozowe, wilgotne, crt1,5. Stan jamy ustnej b/z.

Spojowki rozowe, nadal entropium oka prawego.

Osluchowo bez nieprawidlowosci.

Jama brzuszna mielka, niebolesna, jelita silnie wypelnione treścią.

W okolicy rany na lkp podskornie zbiera sie plyn, nakulam (ropny wyplyw) i oczyscilam .

### Zabiegi

Pobyt doba bezdomne

### Zastosowane leki

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materialy 1 szt

Urikrill Gatto 1 szt.

Aniprazol tabl 0,5 szt.

Unidox solutab 100mg tab 0,5 szt.

CORNEREGEL ŻEL DO OCZU 50MG/G 5G 1 OP

### Zalecenia:

- Urikrill gatto podajemy minimum do 10.08,
- Oridermyl 1 raz dziennie do obu uszu do 21.07,
- Dziś wysłano do badania próbke mocz u pobranego droga naturalnej mikcji - czekamy na wyniki.
- kontrola rany na łapce i zmiana opatrunku wedle potrzeby (granugel na rany )
- w dalszej kolejności kastracja, sanacja jamy ustnej, zabieg chirurgiczny (protezy)
- wg zaleceń okulisty:

\*ogólnie:

- UNIDOX 1/2 tabletki 1 raz dziennie przez 14 dni

\*do obu oczu z zachowaniem 10 minutowego odstępu:

- Vigamox 4 razy dziennie po jednej kropli do obu oczu (łącznie 2-3 tygodnie)
- Comeregel 2-3 razy dziennie do obu oczu 2-3 tygodnie
- najprawdopodobniej w środę zabieg usunięcia entropium i kastracja. ( do potwierdzenia)
- dziś ostatnia dawka Aniprazol; kolejna pięciodniowa kuracja OD 28.07
- kontrolne zbiórka kału do badania od 15.08 (dwa tygodnie po ukończeniu drugiej serii odrobaczania)

Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

**14/07/2017 14:52: -**

**Zabiegi**

VETLAB -MOCZ OGÓLNY plus KREATYNINA

Zarejestrował: AA Laboratorium

**15/07/2017 13:36: Badanie**

Opis wywiadu: Czuje się dobrze, zniecierpliwia się już przy podawaniu leków do oczu.  
Kał i mocz oddaje prawidłowo.

Wyniki moczu, ale białko nadal na (++) , Urikrill bez zmian.

**Opis badania:**

Błony śluzowe jamy ustnej różowe, wilgotne, crt1,5s. Stan jamy ustnej bez zmian.

Spojówki lekko zaczerwienione, coraz mniej ropnej wydzieliny w oczach.

Węzły chłonne obwodowe ok, osłuchowo mruczenie.

Jama brzuszna lekko wzdęta, jelita lekko pogrubiałe, niebolesna.

**Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

**Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 1 szt

Urikrill Gatto 1 szt.

Unidox solutab 100mg tab 0,5 szt.

CORNEREGEL ŻEL DO OCZU 50MG/G 5G 1 OP

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

**Zalecenia:**

- Urikrill gatto podajemy minimum do 10.08,
- Oridermyl 1 raz dziennie do obu uszu do 21.07,
- kontrola rany na łapce i zmiana opatrunku wedle potrzeby (granugel na rany )
- w dalszej kolejności sanacja jamy ustnej, zabieg chirurgiczny (protezy)
- wg zaleceń okulisty:

\*ogólnie:

- UNIDOX 1/2 tabletki 1 raz dziennie przez 14 dni

\*do obu oczu z zachowaniem 10 minutowego odstępu:

- Vigamox 4 razy dziennie po jednej kropli do obu oczu (łącznie 2-3 tygodnie)
- Comeregel 2-3 razy dziennie do obu oczu 2-3 tygodnie
- W środę zabieg usunięcia entropium i kastracja.
- Kolejna pięciodniowa kuracja Aniprazolem OD 28.07
- kontrolne zbiórka kału do badania od 15.08 (dwa tygodnie po ukończeniu drugiej serii odrobaczania)

Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

## 17/07/2017 11:16: Badanie

Opis wywiadu: Samopoczucie dobre

Zdejmuje opatrunki

### Opis badania:

Błony śluzowe różowe, węzły chłonne żuchwowe nieznacznie powiększone, podkolanowe w normie, kamień nazębny, zaczerwienione dziąsła, kanały słuchowe bez wydzieliny i stanu zapalnego, mruczy podczas osłuchiwania, brzuch miękki, nie bolesny

Niewielka ilość ropnego wysięku z rany - lkp

Diagnoza: Zapalenie spojówek, entropium

Giardioza

### Zabiegi

Pobył doba bezdomne 2

rozliczenie 16-17.07.17

### Zastosowane leki

Bioimmunex felis 40 kaps 2 szt.

Inne materiały 2 szt

Urikrill Gatto 2 szt.

Unidox solutab 100mg tab 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 2 kaps

### Zalecenia:

- Urikrill gatto 1 xdz min do 10.08

- Oridemyl 1 raz dziennie do obu uszu do 21.07

- toaleta rany

- w dalszej kolejności sanacja jamy ustnej, zabieg chirurgiczny (protezy)

- wg zaleceń okulisty:

\*ogólnie:

- UNIDOX 1/2 tabletki 1 raz dziennie przez 14 dni

\*do obu oczu z zachowaniem 10 minutowego odstępu:

- Vigamox 4 razy dziennie po jednej kropli do obu oczu (łącznie 2-3 tygodnie)

- Comeregel 2-3 razy dziennie do obu oczu 2-3 tygodnie

- W środę zabieg usunięcia entropium i kastracja.

- Aniprazol 1/2 tabl 1xdz przez 5 dni, od 28.07

- kontrolne zbiórka kału do badania od 15.08

Zarejestrował: lek. wet. Agnieszka Zielonka

### **18/07/2017 17:08: Badanie**

Opis wywiadu: Samopoczucie dobre

Apetyt zachowany

Mocz i kał oddaje prawidłowo

#### **Opis badania:**

W badaniu klinicznym jak wczoraj

#### **Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

#### **Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 1 szt

Urikrill Gatto 1 szt.

Unidox solutab 100mg tab 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

ORIDERMYL / 10 G 1 szt.

#### **Zalecenia:**

- Urikrill gatto 1 xdz min do 10.08

- Oridermyl 1 raz dziennie do obu uszu do 21.07

- toaleta rany

- w dalszej kolejności sanacja jamy ustnej, zabieg chirurgiczny (protezy)

- wg zaleceń okulisty:

\*ogólnie:

- UNIDOX 1/2 tabletki 1 raz dziennie przez 14 dni

\*do obu oczu z zachowaniem 10 minutowego odstępu:

- Vigamox 4 razy dziennie po jednej kropli do obu oczu (łącznie 2-3 tygodnie)

- Comeregel 2-3 razy dziennie do obu oczu 2-3 tygodnie

- jutro zabieg usunięcia entropium i kastracja

- Aniprazol 1/2 tabl 1xdz przez 5 dni , od 28.07

- kontrolne zbiórka kału do badania od 15.08

Zarejestrował: lek. wet. Agnieszka Zielonka

### **19/07/2017 07:57: Badanie**

Temperatura: 38,0°C

Waga: 4,3 kg

Opis wywiadu: Dzisiaj zabieg entropium + kastracja.

Na czczo.

Samopoczucie dobre.

**Opis badania:**

błony śluzowe różowe, stan zapalny dziąseł, ww chłonne żuchwowe powiększone, osłuchiwanie uniemożliwione przez mruczenie, jama brzuszna miękka, niebolesna, nerki dobrze wyczuwalne, powierzchnia gładka,

rana na lkp zasklepią, bez wypływu ropnego,  
zdeponowano orideryl do kanałów słuchowych,  
podano Unidox p.o.  
krople do oczu podano

**Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

**Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.  
Inne materiały 1 szt  
Urikrill Gatto 1 szt.  
BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

**Zalecenia:**

- Urikrill gatto 1 xdz min do 10.08
- Orideryl 1 raz dziennie do obu uszu do 21.07
- toaleta rany
- w dalszej kolejności sanacja jamy ustnej, zabieg chirurgiczny (protezy)
- wg zaleceń okulisty:

\*ogólnie:

- UNIDOX 1/2 tabletki 1 raz dziennie wstępnie do 26.07

\*do obu oczu z zachowaniem 10 minutowego odstępu:

- Vigamox 4 razy dziennie po jednej kropli do obu oczu (łącznie 2-3 tygodnie)

- Corneregel 2-3 razy dziennie do obu oczu 2-3 tygodnie

- Aniprazol 1/2 tabl 1xdz przez 5 dni , od 28.07

- kontrolne zbiórka kału do badania od 15.08

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

**19/07/2017 12:03: Badanie****Opis badania:**

Operacja entropium dolnej powieki oka prawego metodą H-C.

**Zabiegi**

O inna

**Zastosowane leki**

Pole operacyjne Buster S z klejem 1 szt  
Gaza sterylna 1,0 m2 1 szt.  
RĘKAWICE STERYLNE 6.5 / ANSEL 1 PARA  
SAFIL 2-0 TNÍCA DS 24 70CM / C1048236 1 SZT.

**Zalecenia:**

- kołnierz ochronny do czasu zdjęcia szwów
- zdjęcie szwów za 14 dni
- przez 2-3 dni może utrzymywać się obrzęk operowanej okolicy okolicy

- codzienna toaleta dolnej powieki przegotowaną wodą

- do oczu:

Vigamox 3 razy dz. po 1 kropli do obu oczu 14 dni

10 minut przerwy

Comeregel 2 razy dz. do oka P oraz raz dz. do oka I 14 dni

- kontynuacja Unidoxu wg. wcześniejszych zaleceń

Zarejestrował: lek.wet. Oliwia Łobaczewska

## 19/07/2017 13:20: Badanie

### Opis badania:

W znieczuleniu ogólnym wykonano zabieg kastracji bez osłon z użyciem autopodwiązek.

Proszę o obserwacje zwierzęcia do 2 tygodni od zabiegu ze względu na ryzyko wystąpienia syndromu pokastracyjnego - osowiałość, spadek apetytu kota powinien skłonić nas do wizyty kontrolnej u lek prowadzącego.

Ropny wysięk z rany - lkp : toaleta rany , złożono opatrunek z Anigranem

### Zabiegi

Anestezjologia 50

ZNIŻKA DLA FUNDACJI

O kastracja kota bezdomnego z mater 0,5

### Zastosowane leki

Dexdomitor 0,1 ml

TORBUGESIC / 10 ML INJ. 0,1 1 ml

Midanium inj. 15mg/3ml 1 amp

Scanofol 10 mg/ml fiol. 20 ml 2 ml

Bioketan inj. 10ml 0,2 ml

LOXICOM 5MG 0,15 ml.

Bunondol inj. 0,3mg/1ml 1 amp

*Dawkowanie: 0,15 ml na błony śluzowe*

RĘKAWICE STERYLNE 6.5 / ANSEL 1 PARA

Sol 250 ml NaCl:GLUKOZA 1:1 1 szt.

*Dawkowanie: 150 ml i.v.*

Ostrze skalpel 1 szt

Anigran Żel 0,2 ml

SOLVERTYL inj. 50mg/2ml \* 5amp. 0,5 5amp.

WENFLON NIEBIESKI 1 szt.

Inne materiały 1 szt

### Zalecenia:

- opatrunek do zmiany za 2 dni

Zarejestrował: lek. wet. Agnieszka Zielonka

## 19/07/2017 13:27: -

### Zastosowane leki

Kołnierz 10cm 1 szt.

Zarejestrował: lek. wet. Agnieszka Zielonka

## 20/07/2017 08:09: Badanie

Temperatura: 38,3°C

### Opis badania:

Błony śluzowe różowe, węzły chłonne żuchwowe nieznacznie powiększone, podkolanowe w normie, zapalenie



spojówek, rana powieki goi się prawidłowo , kamień nazębny, zaczerwienione dziąsła, mruczy podczas osłuchiwania , brzuch miękki, nie bolesny

Moszna - niewielki obrzęk

### **Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

### **Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 1 szt

Urikrill Gatto 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Unidox solutab 100mg tab 1 szt.

SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2 ML 0,5 szt.

LOXICOM 5MG 0,15 ml.

### **Zalecenia:**

- Unidox 1/2 tabl 1xdz

- kołnierz ochronny do czasu zdjęcia szwów

- zdjęcie szwów za 14 dni

- codzienna toaleta dolnej powieki przegotowaną wodą

- do oczu:

Vigamox 3 razy dz. po 1 kropli do obu oczu 14 dni

10 minut przerwy

Corneregel 2 razy dz. do oka P oraz raz dz. do oka I 14 dni

- Urikrill gatto 1 xdz min do 10.08

- Oridermyl 1 raz dziennie do obu uszu do jutra

- Aniprazol 1/2 tabl 1xdz przez 5 dni , od 28.07

- kontrolne zbiórka kału do badania od 15.08

- w dalszej kolejności sanacja jamy ustnej, zabieg chirurgiczny (protezy)

Zarejestrował: lek. wet. Agnieszka Zielonka

## **20/07/2017 08:16: Badanie**

### **Opis badania:**

KOSZT JEDNEJ PROTEZY TO 2000-3000 PLN + KOSZT TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

Zarejestrował: lek. wet. Agnieszka Zielonka

## **21/07/2017 16:43: Badanie**

Opis wywiadu: Czuje się dobrze, apetyt zachowany.

### **Opis badania:**

Błony śluzowe jamy ustnej różowe, wilgotne , crt 1,5s.

Obrzęk powiek w operowanym oczku, niewielka ilość zalegającej ropnej wydzieliny.

Węzły chłonne podżuchwowe rozpuszczalne, pozostałe bez zmian.

Jama brzuszna miękka, niebolesna.  
Osluchowo mruczenie.

### **Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

### **Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.  
Inne materiały 1 szt  
Urikrill Gatto 1 szt.  
BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps  
Unidox solutab 100mg tab 1 szt.  
SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2 ML 0,5 szt.  
LOXICOM 5MG 0,15 ml.

### **Zalecenia:**

- Unidox 1/2 tabl 1xdz
- kołnierz ochronny do czasu zdjęcia szwów
- zdjęcie szwów za 14 dni
- codzienna toaleta dolnej powieki przegotowaną wodą
- do oczu:

Vigamox 3 razy dz. po 1 kropli do obu oczu 14 dni

10 minut przerwy

Corneregel 2 razy dz. do oka P oraz raz dz. do oka I 14 dni

- Urikrill gatto 1 xdz min do 10.08
  - Aniprazol 1/2 tabl 1xdz przez 5 dni , od 28.07
  - kontrolne zbiórka kału do badania od 15.08
  - w dalszej kolejności sanacja jamy ustnej, zabieg chirurgiczny (protezy)
- Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

## **22/07/2017 10:37: Badanie**

Opis wywiadu: Czuje się dobrze, ma dobry apetyt.

### **Opis badania:**

Spojówki prawego oka czerwone ale rana ładna, czysta, bez obrzęku. Toaleta.  
Rana pokastracyjna w trakcie gojenia.  
Zmiana opatrunku z kończyny piersiowej - mała ilość krwistego wypływu, jodoform.  
Wyłysienie bez zmian.

+ krople do oczu

### **Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

### **Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.  
Inne materiały 1 szt  
Urikrill Gatto 1 szt.  
BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps  
Unidox solutab 100mg tab 1 szt.  
Zarejestrował: lek. wet. Maria Kłucjasz

**23/07/2017 14:19: -**

**Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

**Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 1 szt

Urikrill Gatto 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Unidox solutab 100mg tab 1 szt.

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

**24/07/2017 16:22: Badanie**

Opis wywiadu: samopoczucie dobre

apetyt zachowany

**Opis badania:**

waga 4,34

temp 37,5

ww chł obwodowe niepowiększone,

osłuchowo bez zmian,

brzuch miękki, niebolesny,

rana pokastracyjna z lekkim obrzękiem - bez wysięku,

spojówki operowanego oka delikatnie zaczerwienione, oczyszczono brzeg powiekowy

**Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

**Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 1 szt

*Dawkowanie: podano unidox 1/2 tabl*

Urikrill Gatto 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

**26/07/2017 09:10: Badanie**

Opis wywiadu: samopoczucie dobre, apetyt w normie

**Opis badania:**

błony śluzowe różowe, stan zapalny dziąseł, okolica operowanego oka sucha i czysta, spojówki nadal rozpulchnione, osłuchiwanie utrudnione przez mruczenie, brzuch miękki, niebolesny 33

Unidox już odstawiamy

**Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

**Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 1 szt

*Dawkowanie: podano unidox 1/2 tabl*

Urikrill Gatto 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

**Zalecenia:**

- kołnierz ochronny do czasu zdjęcia szwów

- zdjęcie szwów 2.08

- codzienna toaleta dolnej powieki przegotowaną wodą

- do oczu:

Vigamox 3 razy dz. po 1 kropli do obu oczu 14 dni

10 minut przerwy

Comeregel 2 razy dz. do oka P oraz raz dz. do oka I 14 dni

- Urikrill gatto 1 xdz min do 10.08

- Aniprazol 1/2 tabl 1xdz przez 5 dni , od 28.07

- kontrolne zbiórka kału do badania od 15.08

- w dalszej kolejności sanacja jamy ustnej, zabieg chirurgiczny (protezy)

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

## 27/07/2017 09:38: Badanie

Temperatura: 37,4°C

Waga: 4,3 kg

Opis wywiadu: Samopoczucie dobre

Apetyt zachowany

Kał uformowany

### **Opis badania:**

Błony śluzowe różowe, czas kapilarny 1,5 sek, węzły chłonne żuchwowe nieznacznie powiększone, podkolanowe w normie, zapalenie spojówek, kamień nazębny, zaczerwienione dziąsła, kanały słuchowe bez wydzieliny i stanu zapalnego, mruczy podczas osłuchiwania , brzuch miękki, nie bolesny

Rana powieki dolnej oraz moszna goją się prawidłowo

Ropny wysięk z rany - lkp (toaleta rany, anigran, opatrunek)

### **Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

### **Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 1 szt

Urikrill Gatto 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

SYNULOX INIEKCJA / 100 ML INJ. 0,3 ml

### **Zalecenia:**

- wskazane kontrolne RTG lewej kończyny piersiowej oraz lewej kończyny miednicznej

- toaleta rany lewej kończyny piersiowej

- Synergol 1xdz

- zdjęcie szwów 2.08

- kołnierz ochronny do czasu zdjęcia szwów

- codzienna toaleta dolnej powieki

- do oczu:

Vigamox 3 razy dz. po 1 kropli do obu oczu 14 dni

10 minut przerwy

Comeregel 2 razy dz. do oka P oraz raz dz. do oka I 14 dni

- Urikrill gatto 1 xdz min do 10.08

- Aniprazol 1/2 tabl 1xdz przez 5 dni , od 28.07
- kontrolne badanie kału od 15.08
- w dalszej kolejności sanacja jamy ustnej oraz ew endoprotezy (do decyzji opiekunów)

Zarejestrował: lek. wet. Agnieszka Zielonka

## 27/07/2017 11:55: Badanie

### Opis badania:

zdjęcie odcinków obwodowych kończyny piersiowej/miedniczne lewej

stan po urazie dłoni. jedynie nietknięta kość nadgarstkowa łokciowa/promieniowa chociaż zmiany zwyrodnieniowe z podejrzeniem powstałego martwaka kostnego utrudniają dokładną ocenę uszkodzeń. pozostawiony jeden palec. prawdopodobnie konieczny będzie zabieg amputacji z ewentualnym protezowaniem?

stan po urazie stopy. Widoczne dalsze końce kości piszczelowej i strzałkowej. W odcinku obwodowym zachowany jedynie guz piętowy kości piętowej.

### Zabiegi

Rtg bezdomne 2

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

## 27/07/2017 15:35: Badanie

Opis wywiadu: RTG wysłano do oceny przez dr J.Lipińskiego

Zarejestrował: lek. wet. Agnieszka Zielonka

## 28/07/2017 14:07: Badanie

Opis wywiadu: Czuje się dobrze, mocz oddaje poza kuwetą.

Apetyt ma zachowany.

### Opis badania:

Błony śluzowe jamy ustnej różowe, wilgotne, crt2s. Stan jamy ustnej bez zmian.

Węzły chłonne bez zmian, spojówki białoróżowe, rana na oczku goi się ładnie.

Osluchowo bez nieprawidłowości.

Jama brzuszna miękka, niebolesna.

Spod rany na łapce usunięto niewielką ilość ropnej wydzieliny.

### Zabiegi

Pobył doba bezdomne

### Zastosowane leki

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 1 szt

Urikrill Gatto 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

SYNULOX INIEKCJA / 100 ML INJ. 0,3 ml

### Zalecenia:

- toaleta rany lewej kończyny piersiowej
- Synergal 1xdz (min 7 dni tj do 02.08)wtedy decyzja o zakończeniu lub kontynuacji
- zdjęcie szwów 2.08
- kołnierz ochronny do czasu zdjęcia szwów
- codzienna toaleta dolnej powieki

- do oczu:

Vigamox 3 razy dz. po 1 kropli do obu oczu 14 dni

10 minut przerwy

Comeregel 2 razy dz. do oka P oraz raz dz. do oka I 14 dni

- Urikrill gatto 1 xdz min do 10.08

- Aniprazol 1/2 tabl 1xdz przez 5 dni , od 28.07

- kontrolne badanie kału od 15.08

- w dalszej kolejności sanacja jamy ustnej oraz ew endoprotezy (do decyzji opiekunów)

Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

## 29/07/2017 15:02: Badanie

Opis wywiadu: Czuje się dobrze, apetyt zachowany.  
Kał i mocz oddaje prawidłowo, lecz poza kuwetą.

### Opis badania:

Błony śluzowe jamy ustnej różowe, wilgotne, crt2s. Stan jamy ustnej bez zmian.

Spojówki bladoróżowe, węzły chłonne bez zmian.

Osluchowo bez nieprawidłowości.

Jama brzuszna miękka, niebolesna.

Rana na KPL bez ropnego wysięku.

### Zabiegi

Pobył doba bezdomne

### Zastosowane leki

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 1 szt

Urikrill Gatto 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

SYNULOX INIEKCJA / 100 ML INJ. 0,3 ml

### Zalecenia:

- toaleta rany lewej kończyny piersiowej

- Synergal 1xdz (min 7 dni tj do 02.08)wtedy decyzja o zakończeniu lub kontynuacji

- zdjęcie szwów 2.08

- kołnierz ochronny do czasu zdjęcia szwów

- codzienna toaleta dolnej powieki

- do oczu:

Vigamox 3 razy dz. po 1 kropli do obu oczu 14 dni

10 minut przerwy

Comeregel 2 razy dz. do oka P oraz raz dz. do oka I 14 dni

- Urikrill gatto 1 xdz min do 10.08
- Aniprazol 1/2 tabl 1xdz przez 5 dni , od 28.07
- kontrolne badanie kału od 15.08
- w dalszej kolejności sanacja jamy ustnej oraz ew endoprotezy (do decyzji opiekunów)

Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

### 30/07/2017 13:52: -

#### **Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

#### **Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 1 szt

Urikrill Gatto 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

SYNULOX INIEKCJA / 100 ML INJ. 0,3 ml

Aniprazol tabl 1 szt.

Zarejestrował: Animal Center

### 31/07/2017 10:37: Badanie

Opis wywiadu: Samopoczucie dobre

Apetyt zachowany

#### **Opis badania:**

Błony śluzowe różowe, czas kapilarny 1,5 sek, węzły chłonne żuchwowe nieznacznie powiększone, podkolanowe w normie, zapalenie spojówek, kamień nazębny, zaczerwienione dziąsła, kanały słuchowe bez wydzieliny i stanu zapalnego, mruczy podczas osłuchiwania , brzuch miękki, nie bolesny

Ropno - krwisty wysięk z rany - lkp (toaleta rany, Vagothyl)

#### **Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

#### **Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 1 szt

Urikrill Gatto 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

SYNULOX INIEKCJA / 100 ML INJ. 0,3 ml

Aniprazol tabl 1 szt.

#### **Zalecenia:**

- w dniu jutrzejszym konsultacja ortopedyczna - lek wet Juliusz Lipinski

- Synergol 1xdz

- toaleta rany lewej kończyny piersiowej

- zdjęcie szwów powieki dolnej 2.08

- kołnierz ochronny do czasu zdjęcia szwów

- codzienna toaleta dolnej powieki

- do oczu:

Vigamox 3 razy dz. po 1 kropli do obu oczu 14 dni

10 minut przerwy

Comeregel 2 razy dz. do oka P oraz raz dz. do oka I 14 dni

- Urikrill gatto 1 xdz min do 10.08
- Aniprazol 1/2 tabl 1xdz do 2.08 włącznie
- kontrolne badanie kału od 15.08
- w dalszej kolejności sanacja jamy ustnej oraz ew endoprotezy (do decyzji opiekunów)

Zarejestrował: lek. wet. Agnieszka Zielonka

## 01/08/2017 10:47: Badanie

Opis wywiadu: Czuje się dobrze, apetyt zachowany.

### **Opis badania:**

Błony śluzowe jamy ustnej różowe, wilgotne, crt 1,5s. Stan jamy ustnej bez zmian.  
Spojówki bladoróżowe, węzły chłonne podżuchwowe lekko powiększone, podkolanowe w normie.  
Osluchowo bez nieprawidłowości.  
Jama brzuszna miękka, niebolesna.

Ropno - krwisty wypływ z rany, wykonano toaletę rany (NaCl, octenisept, jodyna)

### **Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

### **Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.  
Inne materiały 1 szt  
Urikrill Gatto 1 szt.  
BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps  
SYNULOX INIEKCJA / 100 ML INJ. 0,3 ml

### **Zalecenia:**

- dzisiaj konsultacja ortopedyczna - lek wet Juliusz Lipinski
- Synergol 1xdz (dziś dostaje 6ty dzień, na razie kontynuujemy)
- toaleta rany lewej kończyny piersiowej
- zdjęcie szwów powieki dolnej 2.08
- kołnierz ochronny do czasu zdjęcia szwów
- codzienna toaleta dolnej powieki
- do oczu:

Vigamox 3 razy dz. po 1 kropli do obu oczu 14 dni

10 minut przerwy

Comeregel 2 razy dz. do oka P oraz raz dz. do oka I 14 dni

- Urikrill gatto 1 xdz min do 10.08
- Aniprazol 1/2 tabl 1xdz do 2.08 włącznie
- kontrolne badanie kału od 15.08



- w dalszej kolejności sanacja jamy ustnej oraz ew endoprotezy (do decyzji opiekunów)  
Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

## 02/08/2017 09:55: Badanie

Opis wywiadu: Czuje się dobrze, apetyt zachowany. Kał i mocz oddaje prawidłowo.  
Dziś zdjęcie szwów po zabiegu entropium.

### Opis badania:

Błony śluzowe jamy ustnej różowe, wilgotne, crt1,5s. Stan jamy ustnej bez zmian.  
Węzły chłonne obwodowe bez zmian. Spojówki bladoróżowe.  
Osluchowo bez nieprawidłowości. Jama brzuszna miękka, niebolesna.

Z rany tylko niewielki krwisty wypływ. zdezynfekowano octeniseptem.

### Zabiegi

Pobył doba bezdomne

### Zastosowane leki

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.  
Inne materiały 1 szt  
Urikrill Gatto 1 szt.  
BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps  
SYNULOX INIEKCJA / 100 ML INJ. 0,3 ml  
Aniprazol tabl 1 szt.  
CORNEREGEL ŻEL DO OCZU 50MG/G 5G 1 0P

### Zalecenia:

- Synergal 1xdz min łącznie 10-14 dni ( do 09.08 środa)

- toaleta rany lewej kończyny piersiowej

- kołnierz ochronny do czasu zdjęcia szwów

- do oczu:

Corneregel 2 razy dz. do oka P oraz raz dz. do oka I 14 dni

- Urikrill gatto 1 xdz min do 10.08

- Dziś ostatni raz Aniprazol 1/2 tabl

- kontrolne badanie kału od 15.08

- w dalszej kolejności sanacja jamy ustnej oraz ew endoprotezy (do decyzji opiekunów)  
Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

## 04/08/2017 22:48: Badanie

### Opis badania:

Rana na kpl lekko obrzęknięta, bez ropnego wypływu.  
Oko prawe po zabiegu wygląda b. ładnie.

### Zabiegi

Pobył doba bezdomne 2  
rozliczenie za 03 i 04.08

### Zastosowane leki

Bioimmunex felis 40 kaps 2 szt.  
*Dawkowanie: rozliczenie za 03 i 04.08*  
Inne materiały 2 szt  
*Dawkowanie: rozliczenie za 03 i 04.08*  
Urikrill Gatto 2 szt.  
*Dawkowanie: rozliczenie za 03 i 04.08*  
BIOPROTECT 60 KAPS. 2 kaps  
*Dawkowanie: rozliczenie za 03 i 04.08*

**Zalecenia:**

- toaleta rany lewej kończyny piersiowej

- do oczu:

Corneregel 2 razy dz. do oka P oraz raz dz. do oka I 14 dni

- Urikrill gatto 1 xdz min do 10.08

- kontrolne badanie kału od 15.08

- w dalszej kolejności sanacja jamy ustnej oraz ew endoprotezy (do decyzji opiekunów)

Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

**05/08/2017 14:25: Badanie**

Temperatura: 38,2°C

Opis wywiadu: Samopoczucie dobre

Apetyt zachowany

Kał uformowany

Wylizuje lkp

**Opis badania:**

Błony śluzowe różowe, czas kapilarny 1,5 sek, węzły chłonne żuchwowe nieznacznie powiększone, podkolanowe w normie, zapalenie spojówek, kamień nazębny, zaczerwienione dziąsła, kanały słuchowe bez zmian, mruczy podczas osłuchiwania, brzuch miękki, nie bolesny

Ropno - krwisty wysięk z rany w lkp (toaleta rany, Vagothyl)

**Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

**Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 1 szt

Urikrill Gatto 1 szt.

**Zalecenia:**

- 9.08 kontrola okulistyczna -lek wet Oliwia Lis Łobaczaska

- 8.08 kontrola ortopedyczna - lek wet Juliusz Lipinski

- toaleta rany lewej kończyny piersiowej 2xdz

- do oczu: Corneregel 2 razy dz. do oka P oraz raz dz. do oka

- Urikrill gatto 1 xdz min do 10.08

- od 28.08 Aniprazol 1/2 tabl 1xdz przez 5 dni ( 3 serie Aniprazolu ze względu na giardiozę)

- od 11.09 kontrolne badanie kału

- w dalszej kolejności sanacja jamy ustnej oraz ew endoprotezy (do decyzji opiekunów)

Zarejestrował: lek. wet. Agnieszka Zielonka

**06/08/2017 19:19: -****Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

**Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 1 szt  
Urikrill Gatto 1 szt.  
Zarejestrował: lek. wet. Anna Misiak

## 07/08/2017 08:03: Badanie

Waga: 4,24 kg  
Opis wywiadu: samopoczucie dobre,  
kał uformowany

### Opis badania:

Krwisto ropny wypływ z rany - lkp

### Zabiegi

Pobył doba bezdomne

### Zastosowane leki

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.  
Inne materiały 1 szt  
Urikrill Gatto 1 szt.

### Zalecenia:

- 9.08 kontrola okulistyczna lek wet Oliwia Lis Łobaczewska
- 8.08 kontrola ortopedyczna - lek wet Juliusz Lipinski
- toaleta rany lewej kończyny piersiowej 2xdz
- do oczu: Comeregel 2 razy dz. do oka P oraz raz dz. do oka
- Urikrill gatto 1 xdz min do 10.08
- od 28.08 Aniprazol 1/2 tabl 1xdz przez 5 dni ( 3 serie Aniprazolu ze względu na giardiozę)
- od 11.09 kontrolne badanie kału
- w dalszej kolejności sanacja jamy ustnej oraz ew endoprotezy (do decyzji opiekunów)

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

## 08/08/2017 12:16: Badanie

Opis wywiadu: samopoczucie dobre,  
apetyt zachowany

### Opis badania:

temp 37,8  
różowy, węzły chłonne żuchwowe nieznacznie powiększone, podkolanowe bez zmian,  
zapalenie spojówek, zaczerwienione dziąsła,  
osłuchowo mruczy  
brzuch miękki, niebolesny

lkp z niewielką ilością krwistego wysięku pod strupem - toaleta

JL:rokowanie co amputacji zmiażdżonych niefizjologicznie zrosniętych kości śródrezcza wątpliwe, na rtg nie widze martwaka.

Podjęrzewam stawanie na części dłoniowej powoduje uraz naskórka i permanentne zakażenie. Amputacja tej części kończyny może przynieść okresową poprawę, ale ciągłe urażenie skóry przy podpieraniu się kota może skutkować nieogojącą się raną wyżej.

### Zabiegi

Pobył doba bezdomne

### Zastosowane leki

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.  
Inne materiały 1 szt  
Urikrill Gatto 1 szt.

**Zalecenia:**

zalecenia:

- 9.08 kontrola okulistyczna lek wet Oliwia Lis Łobaczewska
  - 8.08 kontrola ortopedyczna - lek wet Juliusz Lipinski
  - toaleta rany lewej kończyny piersiowej 2xdz
  - do oczu: Comeregel 2 razy dz. do oka P oraz raz dz. do oka
  - Urikrill gatto 1 xdz min do 10.08
  - od 28.08 Aniprazol 1/2 tabl 1xdz przez 5 dni ( 3 serie Aniprazolu ze względu na giardiozę)
  - od 11.09 kontrolne badanie kału
  - w dalszej kolejności sanacja jamy ustnej oraz ew endoprotezy (do decyzji opiekunów)
- Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

**09/08/2017 09:51: Badanie****Opis badania:**

Kontrola po zabiegu.

**Zalecenia:**

Yellox 3 razy dz. do oka P oraz raz dz. do oka I 14 dni

10 minut przerwy

Comeregel 2 razy dz. po 1 kropli do oka P

Zarejestrował: lek.wet. Oliwia Łobaczewska

**09/08/2017 14:53: Badanie**

Opis wywiadu: Samopoczucie dobre, apetyt zachowany.

Kał i mocz oddaje poza kuwetą.

**Opis badania:**

Błony śluzowe różowe, wilgotne, crt1,5s.

Spojówki blad różowe, węzły chłonne podżuchwowe lekko powiększone, podkolanowe be zmian.

Osluchowo bez nieprawidłowości.

Jama brzuszna miękka, niebolesna.

**Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

**Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 1 szt

Urikrill Gatto 1 szt.

**Zalecenia:**

- Urikrill gatto 1 xdz min do 10.08
- od 28.08 Aniprazol 1/2 tabl 1xdz przez 5 dni ( 3 serie Aniprazolu ze względu na giardiozę)
- od 11.09 kontrolne badanie kału
- w dalszej kolejności sanacja jamy ustnej oraz ew endoprotezy (do decyzji opiekunów)
- Do oczu :

Yellox 3 razy dz. do oka P oraz raz dz. do oka I 14 dni

10 minut przerwy

Comeregel 2 razy dz. po 1 kropli do oka P  
Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

## 10/08/2017 08:05: Badanie

Opis wywiadu: Samopoczucie bez zmian  
Apetyt zachowany,  
Kał prawidłowo uformowany

### Opis badania:

Toaleta rany roztworem manusanu, octeniseptem i jodyną- niewielka ilość krwistego wypływu bez obecności ropnej wydzieliny

### Zalecenia:

- od 28.08 Aniprazol 1/2 tabl 1xdz przez 5 dni ( 3 serie Aniprazolu ze względu na giardiozę)
- codzienna toaleta rany
- od 11.09 kontrolne badanie kału
- w dalszej kolejności sanacja jamy ustnej oraz ew endoprotezy (do decyzji opiekunów)
- Do oczu :

Yellox 3 razy dz. do oka P oraz raz dz. do oka I 14 dni

10 minut przerwy

Comeregel 2 razy dz. po 1 kropli do oka P  
Zarejestrował: lek. wet. Anna Misiak

## 11/08/2017 21:32: Badanie

Opis wywiadu: Czuje się dobrze, apetyt zachowany. Kał i mocz oddaje prawidłowo.

### Opis badania:

Błony śluzowe różowe, wilgotne, crt2s. Kamień nazębny, zapalenie dziąseł, fetor ex ore.  
Spojówki rozpulchnione, zaczerwienione.  
Węzły chłonne podżuchwowe nieznacznie powiększone.  
Zaostrzony smzer nad krtanią i tchawicą, tklica ta okolica.  
Osłuchowo nad sercem i ddo bez zmian.  
Jama brzuszna miękka, niebolesna.

Wykonano toaletę rany na kpl, ropny wypływ. ( manusan, r-r vagothylu)

### Zabiegi

Pobył doba bezdomne

### Zastosowane leki

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.  
Inne materiały 1 szt  
TOLFINE / 100 ML INJ. 0,4 ML  
SOLVERTYL inj. 50mg/2ml \* 5amp. 1 5amp.  
*Dawkowanie: 0,5 ml*

### Zalecenia:

- jutro kontrola samopoczucia Żuberka i powtórzenie leków min do poniedziałku. Dalsza kontynuacja zależnie od samopoczucia.

- od 28.08 Aniprazol 1/2 tabl 1xdz przez 5 dni ( 3 serie Aniprazolu ze względu na giardiozę)
- codzienna toaleta rany
- od 11.09 kontrolne badanie kału
- w dalszej kolejności sanacja jamy ustnej oraz ew endoprotezy (do decyzji opiekunów)
- Do oczu :

Yellox 3 razy dz. do oka P oraz raz dz. do oka I 14 dni

10 minut przerwy

Corneregel 2 razy dz. po 1 kropli do oka P  
Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

## 12/08/2017 15:21: Badanie

Temperatura: 37,2°C

Opis wywiadu: Samopoczucie dobre

Apetyt zachowany

Kał uformowany

### Opis badania:

Błony śluzowe różowe, czas kapilarny 1,5 sek, węzły chłonne żuchwowe nieznacznie powiększone, podkolanowe w normie, zapalenie spojówek, kamień nazębny, zaczerwienione dziąsła, kanały słuchowe bez zmian, mruczy podczas osłuchiwania, brzuch miękki, nie bolesny

Ropno - krwisty wysięk z rany w lkp (toaleta rany, Vagothyl) opatrunek z Anigranem

### Zabiegi

Pobył doba bezdomne

### Zastosowane leki

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 1 szt

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,4 ML

### Zalecenia:

- codzienna toaleta rany
- od 28.08 Aniprazol 1/2 tabl 1xdz przez 5 dni ( 3 serie Aniprazolu ze względu na giardiozę)
- od 11.09 kontrolne badanie kału
- w dalszej kolejności sanacja jamy ustnej oraz ew endoprotezy (do decyzji opiekunów)
- Do oczu :

Yellox 3 razy dz. do oka P oraz raz dz. do oka I 14 dni

10 minut przerwy

Corneregel 2 razy dz. po 1 kropli do oka P  
Zarejestrował: lek. wet. Agnieszka Zielonka

## 13/08/2017 10:27: Badanie

Opis wywiadu: Samopoczucie i apetyt bardzo dobre. W kuwecie mocz i rozluźniona kupa. Brzuch niebolesny i miękki, podano Attapectin.

### Zabiegi

Pobył doba bezdomne

### Zastosowane leki

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.  
Inne materiały 1 szt  
APTUS ATTAPECTIN an TABI 1 tabl  
Zarejestrował: Animal Center

### 14/08/2017 18:30: Badanie

Temperatura: 37,9°C

#### **Opis badania:**

śluzowe różowe, wilgotne  
wypływ brunatny z obu worków spojówkowych- toaleta oczu  
ww. chł. podzuchwowe nieznacznie powiększone, osłuchowo bz  
jama brzuszna nie bolesna

toaleta rany - wysięk krwisty z rany

#### **Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

#### **Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.  
Inne materiały 1 szt  
APTUS ATTAPECTIN an TABI 1 tabl  
Zarejestrował: lek. wet Magdalena Kraińska- Łosek

### 15/08/2017 14:32: Badanie

Opis wywiadu: Czuje się dobrze, apetyt zachowany.  
Kał i mocz prawidłowo oddane w kuwecie.  
Zmieniono opatrunek - niewielka ilość wysięku krwistego.

#### **Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

#### **Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.  
Inne materiały 1 szt  
Zarejestrował: Animal Center

### 16/08/2017 14:38: Badanie

Opis wywiadu: samopoczucie bardzo dobre

#### **Opis badania:**

w badaniu klinicznym ogólnym bez zmian  
krwisty wyciek z rany  
toaleta rany  
zmiana opatrunku

#### **Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

TOALETA RANY 1

#### **Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.  
Inne materiały 1 szt

#### **Zalecenia:**

- zalecenia bez zmian

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

### 17/08/2017 16:21: -

#### **Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

**Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 1 szt

**Zalecenia:**

- wymaz z rany

- sanacja jamy ustnej 21 lub 23.08

Zarejestrował: lek. wet. Agnieszka Zielonka

**18/08/2017 21:55: -**

**Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

**Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 1 szt

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

**18/08/2017 22:08: -**

**Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

**Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 1 szt

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

**19/08/2017 13:37: Badanie**

Opis wywiadu: w badaniu klinicznym bez zmian

**Opis badania:**

odkażenie rany octaniseptem

**Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

**Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 1 szt

Lysine kot -50 ml żel 1 szt.

*dla wszystkich szpitalnych kotów z Mińska*

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

**20/08/2017 13:40: -**

**Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

TOALETA RANY 1

**Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 2 szt

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

**21/08/2017 16:54: Badanie**

Opis wywiadu: Czuje się dobrze, dużo zaschniętej wydzieliny przy oczkach, szczególnie przy prawym.



Kał prawidłowo uformowany.

**Opis badania:**

Błony śluzowe jamy ustnej różowe, wilgotne crt2s.

Spojówki lekko zaczerwienione, węzły chłonne podżuchwowe lekko powiększone, pozostałe bez zmian.

Osluchowo mruczenie.

Jama brzuszna miękka, niebolesna, pętle jelit lekko pogrubiałe.

Rana na kpl podminowana krwistym wysiękiem. Oczyszczono.

**Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

**Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 2 szt

**Zalecenia:**

- codzienna toaleta rany

- od 28.08 Aniprazol 1/2 tabl 1xdz przez 5 dni ( 3 serie Aniprazolu ze względu na giardiozę)

- od 11.09 kontrolne badanie kału

- w dalszej kolejności sanacja jamy ustnej oraz ew endoprotezy (do decyzji opiekunów)

- Do oczu :

Yellox 3 razy dz. do oka P oraz raz dz. do oka I 14 dni

10 minut przerwy

Corneregel 2 razy dz. po 1 kropli do oka P

W tę środę kontrola oczu.

Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

**22/08/2017 17:01: Badanie**

Temperatura: 37,4°C

Opis wywiadu: Czuje się dobrze, apetyt zachowany.

Kał prawidłowo uformowany, mocz oddaje poza kuwetą.

**Opis badania:**

Błony śluzowe różowe, wilgotne , crt1,5s.Stan jamy ustnej bez zmian.

Spojówki zaczerwienione, wypływ ciemny z prawego oczka.

Osluchowo mruczenie.

Jama brzuszna miękka, niebolesna.

Rana na kpl podminowana ropno-krwistym wysiękiem.Oczyszczono.

**Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

TOALETA RANY 1

**Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 2 szt

**Zalecenia:**

- codzienna toaleta rany

- od 28.08 Aniprazol 1/2 tabl 1xdz przez 5 dni ( 3 serie Aniprazolu ze względu na giardiozę)

- od 11.09 kontrolne badanie kału

- w dalszej kolejności sanacja jamy ustnej oraz ew endoprotezy (do decyzji opiekunów)

- Do oczu :

Yellox 3 razy dz. do oka P oraz raz dz. do oka I 14 dni

10 minut przerwy

Comeregel 2 razy dz. po 1 kropli do oka P

W tę środę kontrola oczu.  
Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

## 23/08/2017 11:16: Badanie

Opis wywiadu: czuje sie dobrze  
dzis kontrola okulistyczna

### Opis badania:

błony śluzowe różowe, ww chłonne żuchwowe miernie powiększone, brzuch miękki, niebolesny

wyciek ropny z rany  
odkażenie - jodyna

### Zabiegi

Pobył doba bezdomne

### Zastosowane leki

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 2 szt

### Zalecenia:

- codzienna toaleta rany

- od 28.08 Aniprazol 1/2 tabl 1xdz przez 5 dni ( 3 serie Aniprazolu ze względu na giardiozę)

- od 11.09 kontrolne badanie kału

- w dalszej kolejności sanacja jamy ustnej oraz ew endoprotezy (do decyzji opiekunów)

- zalecenia dr Oliwii - 1 raz dziennie Difadol/ Yellox

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

## 23/08/2017 19:34: Badanie

Opis wywiadu: Wykonałam RTG uzębienia

Decyzja o ekstrakcji złamanego zęba 409 - pozostałe resztki korzeni.

Ekstrakcja zęba 107.

Ekstrakcja złamanego korzenia zęba 404.

Ekstrakcja złamanych korzeni po zębach siecznych górnych i dolnych

Ekstrakcja zęba 307

Rany poekstrakcyjne zaszyto materiałem wchłaniającym

Ukruszone koniuszki kłów górnych zabezpieczono materiałem światłoutwardzalnym

### Zabiegi

O ZABIEG 3,8

Zarejestrował: lek.wet. Emila Klim

## 24/08/2017 09:34: Badanie

Opis wywiadu: Czuje się dobrze, apetyt zachowany.

Mocz oddaje prawidłowo. Kału jeszcze dziś nie było.

### Opis badania:

Błony śluzowe jamy ustnej różowe, wilgotne , crt1,5s. Rany po ekstrakcjach w jamie ustnej goją się prawidłowo.  
Spojówki zaróżowione, węzły chłonne obwodowe bez zmian.  
Osluchowo bez nieprawidłowości.  
Jama brzuszna miękka, niebolesna.

Rana na kpl bez ropnego wysięgu, oczyszczono i zdezynfekowano jodyną.

#### **Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

#### **Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 2 szt

#### **Zalecenia:**

- codzienna toaleta rany

- od 28.08 Aniprazol 1/2 tabl 1xdz przez 5 dni ( 3 serie Aniprazolu ze względu na giardiozę)

- od 11.09 kontrolne badanie kału

- zalecenia dr Oliwii - 1 raz dziennie Difadol/ Yellox

Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

### **25/08/2017 18:02: Badanie**

Opis wywiadu: samopoczucie super, apetyt w normie

#### **Opis badania:**

jama usta - stan zadowalający, błony śluzowe różowe, ww chłonne żuchwowe miernie powiększone, osłuchiwanie utrudnione przez mruczenie, brzuch miękki, w jelitach zalega spora ilość kału

Rana na kpl bez ropnego wysięgu, oczyszczono i zdezynfekowano jodyną.

#### **Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

#### **Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 2 szt

#### **Zalecenia:**

zalecenia bez zmian

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

### **26/08/2017 16:32: Badanie**

Opis wywiadu: Czuje się dobrze, kał prawidłowo uformowany.

#### **Opis badania:**

W badaniu jak wczoraj, brak ropnego wycieku z rany na kpl.

#### **Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

#### **Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 2 szt

Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

### **27/08/2017 16:42: -**

#### **Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

#### **Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 2 szt

Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

## 28/08/2017 15:44: Badanie

Waga: 4,22 kg

Opis wywiadu: Samopoczucie dobre

Apetyt zachowany

### **Opis badania:**

Błony śluzowe różowe, czas kapilarny 1,5 sek, węzły chłonne żuchwowe i podkolanowe w normie, kanały słuchowe bez zmian, jama ustna goi się prawidłowo, mruczy podczas osłuchiwania, brzuch miękki, nie bolesny

Surowiczo- krwisty wysięk z rany w lkp

### **Zabiegi**

Pobył doba bezdomne

### **Zastosowane leki**

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Inne materiały 2 szt

Interferon Roferon A -dawka 1 szt.

SOL 100ml NaCl 1 szt.

Aniprazol tabl 1 szt.

### **Zalecenia:**

- Bioimmunex 1 xdz

- Lizyna 2xdz

- interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych (kuracja min 3 m-ce)

- Yellox 1 xdz

- codzienna toaleta rany

- Aniprazol 1/2 tabl 1xdz przez 5 dni

- 11.09 kontrolne badanie kału

Zarejestrował: lek. wet. Agnieszka Zielonka

---

Podpis lekarza weterynarii