



**ANIMAL  
CENTER**

**Animal Center Zofia Gaińska**  
ul. Zamiany 12  
02-786 Warszawa  
Telefon: 224141812  
E-mail: [biuro@animal-center.pl](mailto:biuro@animal-center.pl)

### Zwierzę

#### Melonik ZZ Mińska

Gatunek: Kot

Rasa: europejski krótkowłosey

Płeć: samiec

Wiek: 8 miesięcy

Oznakowanie:

Maść: czarno biały

### Właściciel

#### Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!

Kawęczyńska 16 lok 39

03-772 Warszawa

Telefon: 790817818, 691 378 288

Lekarz prowadzący: Zofia Gaińska

## Historia wizyt

### 14/03/2017 16:34: Badanie

Opis wywiadu: Kot od jakiegoś czasu ma kłopoty ma sztywny chód na kk miednicznych, ale nie zawsze czasami normalnie chodzi, poza tym przykry zapach z pyszczka ale zmienia zęby.

W lecznicy w badaniu w ruchu kot nie kule porusza się raczej normalnie.

Brak bolesności stawów, ruchomość w stawach w kk miednicznych prawidłowa, bolą go kości długie szczególnie kość udowa lewa.

RTG-wysycenie kości długich prawidłowe

Proszę o badanie krwi na czczo zestaw rozszerzony z jonogram i kontrolę tel za tydzień

#### Zabiegi

Kons. ortopedyczna 0,7

Rtg bezdomne

Zarejestrował: lek.wet. Juliusz Lipiński

### 30/05/2017 20:05: Badanie

Opis wywiadu: Kot ze zdiagnozowanym zapaleniem mózgu od tygodnia na lekach:

Mannitol 2g /kg x 2 dz.

Encortolon 5 mg 1/4 tabl x 2 dz.

Klindamycyna i.v. 11mg/kg x 2 dz.

nawadnianie

#### Opis badania:

Stan ogólny stabilny, bez poprawy i bez pogorszenia.

Dzisiaj w trakcie wizyty pogorszenie stanu.

Opistotonus, silne drapanie okolicy szyi. Otępienie, słaby oczopląs fizjologiczny. Wokalizacja.

Podejrzewam cechy znacznego wzrostu ciśnienia śródczaszkowego.

Ze względu na pogorszenie:

- zmieniam wenflon
- podaję Mannitol 20 ml i.v. w ciągu 20 minut
- Furosemid 0,4 ml
- Relanium 0,3 ml
- torbugesic 0,03 ml
- NaCl + G 30 ml
- dexaven 0,15 ml

Cukier na glukometrze 128 mg%, temp. 38,4, oddech przyśpieszony, osłuchowo bez zmian, na USG brak cech płynu w kl. piersiowej.

Zalecenia:

- prosze o hospitalizację.
- prosze o podawanie Mannitolu w dawce 20 ml (20%) co 8h, kolejne podanie ok. 3.00
- Encortolon 5 mg 1/2 tabl x 2 dz. lub gdyby nie chciał jeść Dexaven 0,2 ml x 1 dz.
- Klinidamycyna i.v. 11 mg/kg x 2 dz
- prosze rano o pobranie krwi na toxoplasmosę p/ciała
- prosze o wdrożenie po przyjęciu Biotraksonu w dawce 40 mg x 2 dz.
- w razie konieczności uspokojenie najlepiej Midanium + Trobugesic wg. efektu lub propofol.
- właściwe nawodnienie.
- karmienie.
- ew. RTG kl. piersiowej w celu wykluczenia zmian obrzękowych i płynu.

**Zabiegi**

W Neuro. kontynuacja

**Zastosowane leki**

WENFLON ŻÓŁTY 1 szt.

WLEWNIK 1 szt.

Sol 250 ml NaCl:GLUKOZA 1:1 1 szt.

Mannitol 20% inj. 250ml/szkło/ 20 szt.

FUROSEMIDUM INJ.10MG/1ML 2ML 5 SZT. 1 OP.

TORBUGESIC / 10 ML INJ. 0,05 1 ml

Relanium inj. 0,01g/2ml 1 amp

Dexaven 4mg/1ml inj. 10szt 1 szt.

Inne materiały 1 szt

Zarejestrował: lek. wet. Jacek Sobczyński

---

Podpis lekarza weterynarii